

Eprex®

1. Nom comercial i principi actiu

EPREX® (Epoetina alfa) xeringues precarregades.

2. Què és EPREX?

EPREX® és una hormona que estimula la producció de glòbuls vermells.



POSOLOGÍA



Com s'ha de prendre EPREX

S'administra via subcutània (sota la pell).

L'administració s'ha de realitzar seguint els següents passos:

- Deixi la xeringa precarregada fora de la nevera, a temperatura ambient, durant 30 minuts.
- Rentar-se les mans cuidadosament.
- Subjecti fermament la xeringa i retiri la protecció de plàstic de l'agulla.
- Amb la xeringa orientada verticalment, expulsi tot l'aire desplaçant l'èmbol cap a munt. Així, la xeringa precarregada està a punt per al seu ús.
- Desinfecti la pell de la zona d'injecció utilitzant cotó fluix amb alcohol i pessigui la pell entre els dits polze i índex, sense prémer amb força.
- Introdueixi l'agulla en tota la seva longitud formant un angle de 45°.
- Injecti la solució de forma lenta i constant mantenint la pell pessigada.
- Al finalitzar, retiri l'agulla i deixi anar la pell. Desinfecti la pell amb alcohol.

Per cada administració, és important canviar el lloc d'injecció, alternant entre la part posterior del braç, l'abdomen i la part posterior de la cuixa. Mantingui sempre el mateix horari.

Què fer si oblida una dos?

Si s'ha oblidat d'administrar la injecció, faci-ho el més aviat possible. Si han passat més de 24 hores, comuniqui-ho al seu metge o farmacèutic.

Mai prengui una dosi doble per compensar la dosi oblidada.

ADVERTENCIES I PRECAUCIONS



Precaucions (al·lèrgies, excipients DO, embaràs, lactància, vacunes en teràpia biològica, etc.).

Si està embarassada o en període de lactància, si té epilèpsia, si té malaltia hepàtica crònica, si és al·lèrgic al làtex eviti manipular-ho.

No prendre aquest medicament en cas que tingui al·lèrgies a qualsevol dels seus components.

No s'ha d'administrar en cas d'hipertensió mal controlada.

Interaccions

Certs medicaments poden interferir en l'efecte del medicament disminuint el seu efecte o incrementant la seva toxicitat per aquest motiu és molt important que el metge o el farmacèutic estigui al corrent del que està prenent. La seva medicació habitual i que el metge /farmacèutic li ha informat que pot continuar prenent durant el tractament amb EPREX® és:

NO PRENGUI CAP ALTRE MEDICAMENT, SUPLEMENT DIETÈTIC O PLANTA MEDICINAL SENSE CONSULTAR ABANS AMB EL SEU METGE O FARMACÈUTIC

POSSIBLES EFECTES ADVERSOS



Els efectes adversos més freqüents, que no significa que apareguin a tots el pacients, són: mal de cap, dolor en el lloc d'injecció, augment de la pressió arterial, lleuger augment del risc de formació de coàguls en sang, mans i cames inflades i símptomes gripals. Comenti amb el seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquests efectes adversos o qualsevol altre que cregui que està relacionat amb la medicació.

Avisi ràpidament al seu metge si té:

- Una reacció al·lèrgica greu (envermelliment de la pell, dificultat per respirar, ...)
- Signes de sagnat amb femtes negres, sang a l'orina o hematomes importants.
- Signes cardíacs i respiratoris com ansietat, suor freda, palpitations, dolor al pit, mareig, dificultat per respirar.
- Mal de cap intens, convulsions.
- En cas de sobredosi.

CONSERVACIÓ DE EPREX



Conservació del medicament

Mantingui els comprimits en el seu envàs original, a una temperatura ambient inferior a 30°.

No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'envàs.

Advertències

Mantingui els medicaments fora de l'abast dels nens.

Aquest medicament només es pot aconseguir a través del Servei de farmàcia de l'Hospital.

Retorni la medicació sobrant a la farmàcia de l'hospital.

Dipositi les restes del medicament o d'embalatge al punt SIGRE de la farmàcia més propera.

IMPORTANT

PRENDRE TOTES LES DOSIS DEL MEDICAMENT PER TAL D'ASSEGURAR-SE L'ÈXIT DEL TRACTAMENT. Pot ajudar-se d'alarmes (per exemple, alarma del telèfon mòbil) o recordatoris per tal de no oblidar cap presa.

Dades de la Farmàcia:

Nom de la farmàcia:

Horari:

Telèfon:

Email: