

Baraclude® Entecavir

1. Nom comercial i principi actiu

Baraclude® Entecavir

2. Què és ENTECAVIR?

Es un fàrmac antiviral



POSOLOGÍA



Com s'ha de prendre BARACLUDGE

ENTECAVIR s'administra via oral. La dosi recomanada és la que hagi prescrit el metge. Es recomana NO prendre aquest medicament amb aliments: caldrà fer-ho una hora abans de menjar, o dues hores després. Els comprimits, s'han d'empassar sencers amb un got d'aigua, sense mastegar, ni desfer a la boca. Mantingui fora de la vista i abast de nens.

Què fer si oblida una dosi?

En cas de que s'oblidi de prendre alguna dosi: prengui-se-la si no han passat 12 hores des de l'hora habitual de la presa. Si ja han passat 12 hores, no prengui aquesta dosi i prengui la següent a l'hora habitual. Si vomita no repeteixi la dosi.

ADVERTENCIES I PRECAUCIONS



Precaucions (al·lèrgies, excipients DO, embaràs, lactància, vacunes en teràpia biològica, etc.).

- Si vostè és al·lèrgic a Entecavir o a qualsevol dels components del comprimit, com la lactosa.
- Si ha sofert alguna malaltia que afecti de manera important l'absorció intestinal o si s'ha sotmès a una reducció quirúrgica de budell o estómac.
- Si està embarassada o en període de lactància.

Interaccions

Certs medicaments poden interferir en l'efecte del medicament disminuint el seu efecte o incrementant la seva toxicitat per aquest motiu és molt important que el metge o el farmacèutic estigui al corrent del que està prenent. La seva medicació habitual i que el metge /farmacèutic li ha informat que pot continuar prenent durant el tractament amb Entecavir és:

NO PRENGUI CAP ALTRE MEDICAMENT, SUPLEMENT DIETÈTIC O PLANTA MEDICINAL SENSE CONSULTAR ABANS AMB EL SEU METGE O FARMACÈUTIC

POSSIBLES EFECTES ADVERSOS



En algun cas, podria ser que aparegués algun dels efectes adversos següents:

Digestius: nàusees, vòmits, diarrea i mal estar.

Begui molt, eviti begudes amb cafeïna, begues alcohòliques, menjar freqüentment i en poca quantitat, aliments lleugers, aliments rics en fibra.

Nerviosos: insomni, somnolència, mal de cap o fatiga.

Avisi ràpidament el seu metge si té:

Si li apareix alguna reacció al·lèrgica greu (envermelliment de la pell, dificultats en respirar...)

Sobredosi del medicament

Procuri anar a dormir aviat i descansar les hores que li pertoquen, i eviti sopar aliments difícils de digerir.

Davant de qualsevol efecte advers greu i que no cedeixi amb les recomanacions generals, contactar amb el seu metge o amb el servei d'urgències.

CONSERVACIÓ DE BARACLUDE



Conservació del medicament

Mantingui els comprimits en el seu envàs original, a una temperatura ambient inferior a 30°.

No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'envàs.

Advertències

Mantingui els medicaments fora de l'abast dels nens.

Aquest medicament només es pot aconseguir a través del Servei de farmàcia de l'Hospital.

Retorni la medicació sobrant a la farmàcia de l'hospital.

Dipositi les restes del medicament o d'embalatge al punt SIGRE de la farmàcia més propera.

IMPORTANT

PRENDRE TOTES LES DOSIS DEL MEDICAMENT PER TAL D'ASSEGURAR-SE L'ÈXIT DEL TRACTAMENT. Pot ajudar-se d'alarmes (per exemple, alarma del telèfon mòbil) o recordatoris per tal de no oblidar cap presa.

Dades de la Farmàcia:

Nom de la farmàcia:

Horari:

Telèfon:

Email:

Aquest tríptic No conté tota la informació d'aquest medicament i només pretén ser un resum per ajudar al pacient en el seu tractament.
Si té qualsevol dubte o necessita més informació contacti amb el seu metge o farmacèutic.

