

Harvoni® (Ledipasvir+Sofosbuvir),

1. Nom comercial i principi actiu:

Harvoni® (Ledipasvir+Sofosbuvir)

2. Què és Harvoni®?

Harvoni® conté 90mg de Ledipasvir i 400mg de Sofosbuvir



POSOLÒGIA



Com s'ha de prendre ?:

Harvoni®: S'administra via oral. La dosis recomanada és d'un comprimit al dia acompanyat o no de menjar.

NOM MEDICAMENT	8	10	12	14	18	20	22	24
HARVONI								

Què fer si oblida una dosi o vomita?:

Harvoni®:

- Si han passat menys de 18 hores des del moment en que pren Harvoni® habitualment, ha de prendre el comprimit el més aviat possible. A continuació, prengui la següent dosi a l'hora habitual.
- Si han passat menys de cinc hores de la presa, repetir l'administració

ADVERTENCIES I PRECAUCIONS



Precaucions (al·lèrgies, excipients DO, embaràs, lactància, vacunes en teràpia biològica, etc.).

Extrema les precaucions per evitar l'embaràs tant en les pacients tractades com en les parelles dels pacients tractats.

- Dones: No ha de prendre aquest medicament si està embarassada o creu que pot estar-ho.
- No es recomana durant la lactància.

Contraindicació:

- Harvoni® (Ledipasvir+Sofosbuvir): conté lactosa monohidrat. Els pacients amb intolerància hereditària a galactosa, insuficiència de lactasa de Lapp o malabsorció de glucosa o galactosa no han de prendre aquest medicament.
- Per més informació consulteu fitxa tècnica.

Interaccions

Certs medicaments poden interferir en l'efecte del medicament disminuint el seu efecte o incrementant la seva toxicitat per aquest motiu és molt important que el metge o el farmacèutic estigui al corrent del que està prenent..

La seva medicació habitual i que el metge /farmacèutic li ha informat que pot continuar prenent durant el tractament amb Harvoni®:

- | | |
|----------|----------|
| 1. _____ | 5. _____ |
| 2. _____ | 6. _____ |
| 3. _____ | |
| 4. _____ | |

NO PRENGUI CAP ALTRE MEDICAMENT, SUPLEMENT DIETÈTIC O PLANTA MEDICINAL SENSE CONSULTAR ABANS AMB EL SEU METGE O FARMACÈUTIC

POSSIBLES EFECTES ADVERSOS



- Cansanci (fatiga, afogament i anèmia): realitzar exercici moderat
- Cefalea: pot prendre paracetamol (si no hi ha al·lèrgia) 500mg cada 6-8h (mai sobrepassar els 2g al dia)
- Falta de concentració (embotament)

DAVANT DE QUALSEVOL EFECTE ADVERS GREU I QUE NO CEDEIXI AMB LES RECOMANACIONS GENERALS, CONTACTAR AMB EL SEU METGE O AMB EL SERVEI D'URGÈNCIES

CONSERVACIÓ DE VICTRELIS



Conservació del medicament

Harvoni® conservar a temperatura ambient fins a la data de caducitat.

Advertències

Mantingui els medicaments fora de l'abast dels nens.

Aquest medicament només es pot aconseguir a través del Servei de farmàcia de l'Hospital.

Retorni la medicació sobrant a la farmàcia de l'hospital.

Dipositi les restes del medicament o d'embalatge al punt SIGRE de la farmàcia més propera.

IMPORTANT

PRENDRE TOTES LES DOSIS DEL MEDICAMENT PER TAL D'ASSEGURAR-SE L'ÈXIT DEL TRACTAMENT. Pot ajudar-se d'alarmes (per exemple, alarma del telèfon mòbil) o recordatoris per tal de no oblidar cap presa.

Dades de la Farmàcia:

Nom de la farmàcia:

Horari:

Telèfon:

Email: