

Exviera® (Dasabuvir) i Viekirax® (Ombitasvir+Paritaprevir+Ritonavir).

1. Nom comercial i principi actiu

Exviera® (Dasabuvir) i Viekirax® (Ombitasvir+Paritaprevir+Ritonavir).

2. Què és Exviera®/Viekirax®?

Cada comprimit de Viekirax® conté 12,5mg d'Ombitasvir, 75mg de Paritaprevir i 50mg Ritonavir.

Cada comprimit d'Exviera® conté 250mg de Dasabuvir.



POSOLÒGIA



Com s'ha de prendre BOCEPREVIR, RIBAVIRINA, PEGINTERFERÓ:

Exviera®: S'administra via oral. La dosis recomanada és d'un comprimit cada 12 hores amb menjar.

Viekirax®: S'administra via oral. La dosis recomanada és de dos comprimets un cop al dia amb menjar.

Horaris recomanats	8 (esmorzar)	10	12	14	16	18	20 (sopar)	22	24
Exviera®									
Viekirax®	 								

Instruccions d'administració:

Els comprimets s'han d'empassar sencers, sense mastegar, trencar o dissoldre. Mantenir sempre el mateix horari.

Què fer si oblida una dosi o vomita:

Exviera®:

- Si han passat menys de 6 hores del del moment en que pren Exviera® habitualment, ha de pendre el comprimit abans possible. A continuació, prengui la següent dosi a l'hora habitual.

Viekirax®:

- Si han passat menys de 12 hores del del moment en que pren Exviera® habitualment, ha de pendre el comprimit abans possible. A continuació, prengui la següent dosi a l'hora habitual.

ADVERTENCIES I PRECAUCIONS



Precaucions (al·lèrgies, excipients DO, embaràs, lactància, vacunes en teràpia biològica, etc.).

- Dones: No ha de pendre aquest medicament si està embarassada o creu que pot estar-ho, contraindicada la lactància, adopti una mesura anticonceptiva (preservatiu) durant el tractament i fins a 4 mesos després d'haver-lo finalitzat.- Homes: Adopti una mesura anticonceptiva (preservatiu) durant el tractament i fins a 7 mesos després d'haver-lo finalitzat

Contraindicació:

- Exviera® (Dasabuvir): conté lactosa monohidrat, els pacients amb intolerància hereditària a galactosa, insuficiència de lactasa de Lapp (insuficiència observada en certes poblacions de Lapònia) o malabsorció de glucosa o galactosa no han de pendre aquest medicament.

- Viekirax® (Ombitasvir + Paritaprevir + Ritonavir): contraindicat en pacients amb insuficiència hepàtica greu.
- Per més informació consulteu al seu metge/farmacèutic.

Interaccions

Certs medicaments poden interferir en l'efecte del medicament disminuint el seu efecte o incrementant la seva toxicitat per aquest motiu és molt important que el metge o el farmacèutic estigui al corrent del que està prenent. La seva medicació habitual i que el metge /farmacèutic li ha informat que pot continuar prenent durant el tractament amb Exviera® i Viekirax® és:

NO PRENGUI CAP ALTRE MEDICAMENT, SUPLEMENT DIETÈTIC O PLANTA MEDICINAL SENSE CONSULTAR ABANS AMB EL SEU METGE O FARMACÈUTIC

POSSIBLES EFECTES ADVERSOS



- Dermatològics (picor): Ús diari de cremes hidratant i emol·lients, banys amb sobres o sabó d'avena i roba poc ajustada.

DAVANT DE QUALSEVOL EFECTE ADVERS GREU I QUE NO CEDEIXI AMB LES RECOMANACIONS GENERALS, CONTACTAR AMB EL SEU METGE O AMB EL SERVEI D'URGÈNCIES

CONSERVACIÓ DE VICTRELIS



Conservació del medicament

Exviera®: Temperatura ambient fins a la data de caducitat.
Viekirax®: Temperatura ambient fins a la data de caducitat.

Advertències

Mantingui els medicaments fora de l'abast dels nens.
Aquest medicament només es pot aconseguir a través del Servei de farmàcia de l'Hospital.
Retorni la medicació sobrant a la farmàcia de l'hospital.
Dipositi les restes del medicament o d'embalatge al punt SIGRE de la farmàcia més propera.

IMPORTANT

PRENDRE TOTES LES DOSIS DEL MEDICAMENT PER TAL D'ASSEGURAR-SE L'ÈXIT DEL TRACTAMENT. Pot ajudar-se d'alarmes (per exemple, alarma del telèfon mòbil) o recordatoris per tal de no oblidar cap presa.

Dades de la Farmàcia:

Nom de la farmàcia:

Horari:

Telèfon:

Email:

Aquest tríptic No conté tota la informació d'aquest medicament i només pretén ser un resum per ajudar al pacient en el seu tractament.
Si té qualsevol dubte o necessita més informació contacti amb el seu metge o farmacèutic.

