

# Exviera® (Dasabuvir), Viekirax® (OBV+PTV+r) i Ribavirina

## 1. Nom comercial i principi actiu:

Exviera® (Dasabuvir), Viekirax® (OBV+PTV+r) Ribavirina

## 2. Què és?

Cada comprimit de Viekirax® conté 12,5mg d'Ombitasvir, 75mg de Paritaprevir i 50mg Ritonavir, Exviera® conté 250mg de Dasabuvir i Ribavirina en càpsules dures de 200mg



## POSOLOGIA



### Com s'ha de prendre?

- Exviera®: S'administra via oral. La dosi recomanada és d'un comprimit cada 12h amb menjar.
- Viekirax®: S'administra vira oral. La dosi recomanada és de dos comprimits un cop al dia amb menjar.
- Ribavirina: 2 o 3 comprimits cada 12 h (segons prescripció mèdica) amb menjar

NOM MEDICAMENT	8	10	12	14	16	18	20	22	24
EXVIERA									1
VIEKIRAX	2								
RIBAVIRINA	...								...

### Què fer si oblida una dosi o vomita?:

Exviera®:

- Si han passat menys de 6 hores des del moment en que pren Exviera® habitualment, ha de prendre el comprimit abans possible. A continuació, prengui la següent dosi a l'hora habitual.

Viekirax®:

- Si han passat menys de 12 hores des del moment en que pren Viekirax® habitualment, ha de prendre el comprimit abans possible. A continuació, prengui la següent dosi a l'hora habitual.

Ribavirina:

- Si han passat menys de 6 hores des del moment en que pren Ribavirina habitualment, ha de prendre el comprimit. A continuació, prengui la següent dosi a l'hora habitual.

## ADVERTENCIES I PRECAUCIONS



Precaucions (al·lèrgies, excipients DO, embaràs, lactància, vacunes en teràpia biològica, etc.).

- Dones: No ha de prendre aquest medicament si està embarassada o creu que pot estar-ho, contraindicada la lactància, adopti una mesura anticonceptiva (preservatiu) durant el tractament i fins a 4 mesos després d'haver-lo finalitzat - Homes: Adopti una mesura anticonceptiva (preservatiu) durant el tractament i fins a 7 mesos després d'haver-lo finalitzat

### Contraindicació:

- Exviera® (Dasabuvir): conté lactosa monohidrat. Els pacients amb intolerància hereditària a galactosa, insuficiència de lactasa de Lapp o malabsorció de glucosa o galactosa no han de prendre aquest medicament.
- Per més informació consulteu fitxa tècnica

## Interaccions

Certs medicaments poden interferir en l'efecte del medicament disminuint el seu efecte o incrementant la seva toxicitat per aquest motiu és molt important que el metge o el farmacèutic estigui al corrent del que està prenent. La seva medicació habitual i que el metge /farmacèutic li ha informat que pot continuar prenent durant el tractament amb Exviera®, Viekirax® i Ribavirina és:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_

NO PRENGUI CAP ALTRE MEDICAMENT, SUPLEMENT DIETÈTIC O PLANTA MEDICINAL SENSE CONSULTAR ABANS AMB EL SEU METGE O FARMACÈUTIC

## POSSIBLES EFECTES ADVERSOS



- Cansanci (fatiga, afoigament i anèmia): Realitzar exercici moderat.
- Dermatològics (sequedat, envermelliment (rash), picor i caiguda cabell): Ús diari de cremes hidratant i emol·lients, banys amb sobres o sabó d'avena, roba poc ajustada, limitar l'exposició al sol. Evitar tints i permanents (en tots cas els menys agressius) i l'excessiva calor a l'assecar-se el cabell.
- Digestius (nàusees, vòmits, diarrea, estrenyiment): beure aigua abundantment, evitar begudes alcohòliques i amb cafeïna, menjar més freqüentment i en menys quantitat (4/5 menjars al dia), menjar aliments lleugers (verdura, amanides, peix a la planxa) i amb fibra (fruita i cereal).
- Alteracions neurològiques (depressió, ansietat, insomni, irritabilitat, pèrdua de concentració): tècniques de relaxació (ioga) i avisar al metge per si precisa tractament.
- Oculars (sequedat ocular, visió borrosa): Neteja sèrum fisiològic o amb llàgrimes artificials.
- Tos, disnea, congestió nasal
- Pèrdua de gana i pèrdua de pes.
- Dolor muscular, dolor a l'esquena i articulacions

DAVANT DE QUALSEVOL EFECTE ADVERS GREU I QUE NO CEDEIXI AMB LES RECOMANACIONS GENERALS, CONTACTAR AMB EL SEU METGE O AMB EL SERVEI D'URGÈNCIES

## CONSERVACIÓ



### Conservació del medicament

Exviera®, Viekirax® i Ribavirina conservar a temperatura ambient fins a la data de caducitat.

### Advertències

Mantingui els medicaments fora de l'abast dels nens.

Aquest medicament només es pot aconseguir a través del Servei de farmàcia de l'Hospital.

Retorni la medicació sobrant a la farmàcia de l'hospital.

Dipositi les restes del medicament o d'embalatge al punt SIGRE de la farmàcia més propera.

## IMPORTANT

PRENDRE TOTES LES DOSIS DEL MEDICAMENT PER TAL D'ASSEGURAR-SE L'ÈXIT DEL TRACTAMENT. Pot ajudar-se d'alarmes (per exemple, alarma del telèfon mòbil) o recordatoris per tal de no oblidar cap presa.

### Dades de la Farmàcia:

Nom de la farmàcia:

Horari:

Telèfon:

Email: