

PEGASYS® (Peginterferó -2a) XERINGA PRECARREGADA



POSOLOGÍA



Com s'ha de prendre PEGASYS

1 ploma subcutànea/setmanal

Aquesta pauta queda subjecte a possibles modificacions segons criteri mèdic.

Instruccions d'administració

Aquest medicament s'administra per via subcutània (SC) un cop per setmana.


L'administració s'ha de realitzar el mateix dia de la setmana i aproximadament a la mateixa hora. Es recomana abans d'anar a dormir i, si és possible, en cap de setmana o quan es lliuri a la feina, per si apareix algun efecte secundari.

Què fer si oblida una dosi?

Si oblida una dosi i se'n recorda 1 o 2 dies després, administri's la dosi que ha oblidat i segueixi administrant-se les següents el mateix dia de la setmana que ho feia habitualment.

Si oblida una dosi i se'n recorda 3 o 5 dies després, administri's la dosi que ha oblidat i segueixi el tractament a intervals de cinc dies fins recuperar el ritme del calendari previst. Per exemple, si s'administra la injecció els divendres, administri's la dosis que ha oblidat i continuï administrant-se les següents cada cinc dies fins que tornin a caure en divendres.

Si oblida una dosi i se'n recorda 6 dies després, esperi's a la següent administració, és a dir, el mateix dia de la setmana que ho feia habitualment.



ADVERTENCIES I PRECAUCIONS



Interaccions

Certs medicaments poden interferir en l'efecte del medicament disminuint el seu efecte o incrementant la seva toxicitat per aquest motiu és molt important que el metge o el farmacèutic estigui al corrent del que està prenent. La seva medicació habitual i que el metge /farmacèutic li ha informat que pot continuar prenent durant el tractament amb pegasys és:

NO PRENGUI CAP ALTRE MEDICAMENT, SUPLEMENT DIETÈTIC O PLANTA MEDICINAL SENSE CONSULTAR ABANS AMB EL SEU METGE O FARMACÈUTIC.

POSSIBLES EFECTES ADVERSOS



Els efectes secundaris més freqüents, però que no han d'aparèixer necessàriament en tots els pacients, són:

- En relació a la injecció: símptomes semblants a la grip (mal de cap, febre, calfreds, sudoració, dolors musculars,

etc.) i reaccions locals en el lloc d'injecció, que són més freqüents en les primeres injeccions i després desapareixen amb el temps. Per disminuir aquests efectes, pot prendre 1 gr de paracetamol 2 hores abans de la injecció. Si els símptomes continuen, pot continuar amb 500 mg cada 6-8 hores. No prengui més de quatre comprimits de 500 mg (2000mg) al dia.

- Altres efectes secundaris que poden aparèixer: cansament, pèrdua de la gana, pèrdua de pes, irritabilitat, ansietat o depressió, diarrea, sequedat de la pell, lleugera caiguda del cabell.

Davant de qualsevol efecte advers greu i que no cedeixi amb les recomanacions generals, contactar amb el seu metge o amb el servei d'urgències.

CONSERVACIÓ DE PEGASYS



Conservació del medicament

Conservar les xeringues a la nevera (Temp 2-8°C) en el seu envàs original fins al moment de l'administració. No congelar.

Advertències

Si el líquid de la xeringa conté partícules de medicament sense dissoldre o la ploma és defectuosa, no es posi la injecció i porti-la al dispensari de Farmàcia per poder comunicar-ho al laboratori fabricant. La solució que conté el medicament dissolt ha de ser transparent i incolora.

Mantingui els medicaments fora de l'abast dels nens.

Aquest medicament només es pot aconseguir a través del Servei de farmàcia de l'Hospital.

Retorni la medicació sobrant a la farmàcia de l'hospital.

IMPORTANT

PRENDRE TOTES LES DOSIS DEL MEDICAMENT PER TAL D'ASSEGURAR-SE L'ÈXIT DEL TRACTAMENT. Pot ajudar-se d'alarmes (per exemple, alarma del telèfon mòbil) o recordatoris per tal de no oblidar cap presa.

Dades de la Farmàcia:

Nom de la farmàcia:

Horari:

Telèfon:

Email: