

PEGINTRON® (Peginterferon alfa 2b) PLOMA precarregada CLEARCLICK



POSOLÒGIA



Com s'ha de prendre PEGINTRON

1 ploma subcutànea/setmanal

Aquesta pauta queda subjecte a possibles modificacions segons criteri mèdic.

Aquest medicament s'administra per via subcutània (SC) un cop per setmana. L'administració s'ha de realitzar el mateix dia de la setmana i aproximadament a la mateixa hora. Es recomana abans d'anar a dormir i, si és possible, en cap de setmana o quan es lliuri a la feina, per si apareix algun efecte secundari.

Instruccions d'administració

Tregui la ploma de la nevera uns 20 minuts abans de l'administració.

S'injecta subcutàniament a la cuixa o a l'abdomen, alternant cada setmana el lloc d'injecció per evitar dolor al punxar-se. Eviti les zones de la pell amb contusions, ferides o infeccions.

Pas 1: Subjectar la ploma en posició vertical i girar el dosificador al punt "1". Donar la volta un parell de vegades el dispositiu (sense agitar).

Pas 2: Girar el dosificador al punt "2". Desinfectar l'extrem de la ploma amb la tovallola impregnada en alcohol. Treure el paper groc que protegeix l'agulla.

En posició vertical pressioni l'agulla cap a baix fins que quedi fixada. Retirar el protector de l'agulla. Pot ser que surti alguna goteta de líquid. Això és normal.

Pas 3: Girar el dosificador per seleccionar la dosi prescrita.

Si el seu metge no li indica una altra cosa, en principi sempre s'ha de seleccionar 0.5. Automàticament el protector de l'agulla es desplaça i cobreix l'agulla.

Injecció: Injectar perpendicularment a la pell, pessigant amb una mà i subjectant la ploma amb l'altra. Pressionar el disparador i esperar 15 segons sense moure ni separar la ploma de la pell.


Un cop utilitzada la ploma, no la llenci a les escombraries, dipositi-la en un recipient de rebuig adequat.

Què fer si oblida una dosi?

Si oblida una dosi i se'n recorda 1 o 2 dies després, administri's la dosi que ha oblidat i segueixi administrant-se les següents el mateix dia de la setmana que ho feia habitualment.

Si oblida una dosi i se'n recorda 3 o 5 dies després, administri's la dosi que ha oblidat i segueixi el tractament a intervals de cinc dies fins recuperar el ritme del calendari previst. Per exemple, si s'administra la injecció els divendres, administri's la dosi que ha oblidat i continui administrant-se les següents cada cinc dies fins que tornin a caure en divendres.

Si oblida una dosi i se'n recorda 6 dies després, esperi's a la següent administració, és a dir, el mateix dia de la setmana que ho feia habitualment.



ADVERTENCIES I PRECAUCIONS



Interaccions

Certs medicaments poden interferir en l'efecte del medicament disminuint el seu efecte o incrementant la seva toxicitat per aquest motiu és molt important que el metge o el farmacèutic estigui al corrent del que està prenent. La seva medicació habitual i que el metge /farmacèutic li ha informat que pot continuar prenent durant el tractament amb PEGINTRON és:

NO PRENGUI CAP ALTRE MEDICAMENT, SUPLEMENT DIETÈTIC O PLANTA MEDICINAL SENSE CONSULTAR ABANS AMB EL SEU METGE O FARMACÈUTIC.

POSSIBLES EFECTES ADVERSOS



Els efectes secundaris més freqüents, però que no han d'aparèixer necessàriament en tots els pacients, són:

- En relació a la injecció: símptomes semblants a la grip (mal de cap, febre, calfreds, sudoració, dolor musculars, etc.) i reaccions locals en el lloc d'injecció, que són més freqüents en les primeres injeccions i després desapareixen amb el temps. Per disminuir aquests efectes, pot prendre 1 gr de paracetamol 2 hores abans de la injecció. Si els símptomes continuen, pot continuar amb 500 mg cada 6-8 hores. No prengui més de quatre comprimits de 500 mg (2000mg) al dia.
- Altres efectes secundaris que poden aparèixer: cansament, pèrdua de la gana, pèrdua de pes, irritabilitat, ansietat o depressió, diarrea, sequedat de la pell, lleugera caiguda del cabell.

Davant de qualsevol efecte advers greu i que no cedeixi amb les recomanacions generals, contactar amb el seu metge o amb el servei d'urgències.

CONSERVACIÓ DE PEGINTRON



Conservació del medicament

Conservi les plomes a la nevera (2-8 °C), en el seu envàs original, fins al moment de l'administració. No les congeli mai.

Advertències

Si el líquid de la xeringa conté partícules de medicament sense dissoldre o la ploma és defectuosa, no es posi la injecció i porti-la al dispensari de Farmàcia per poder comunicar-ho al laboratori fabricant. La solució que conté el medicament dissolt ha de ser transparent i incolora.

Mantingui els medicaments fora de l'abast dels nens.

Aquest medicament només es pot aconseguir a través del Servei de farmàcia de l'Hospital.

Retorni la medicació sobrant a la farmàcia de l'hospital.

IMPORTANT

PRENDRE TOTES LES DOSIS DEL MEDICAMENT PER TAL D'ASSEGURAR-SE L'ÈXIT DEL TRACTAMENT. Pot ajudar-se d'alarmes (per exemple, alarma del telèfon mòbil) o recordatoris per tal de no oblidar cap presa.

Dades de la Farmàcia:

Nom de la farmàcia:

Horari:

Telèfon:

Email: