

# Olysio® (Simeprevir)

## 1. Nom comercial i principi actiu

Olysio® (Simeprevir)

## 2. Què és OLYSIO?

Cada càpsula dura de Olysio® conté 150mg de Simeprevir.



## POSOLÒGIA



### Com s'ha de prendre SIMEPREVIR, RIBAVIRINA, PEGINTERFERÓ:

**Simeprevir:** S'administra via oral. La dosi recomanada és de 150mg, 1 comprimit al dia amb menjar.

**Ribavirina:** 2 o 3 comprimits cada 12 hores (segons prescripció mèdica) amb una mica de menjar.

Els comprimits i la càpsula s'han d'empassar sencers, sense mastegar, trencar o dissoldre. Mantenir sempre el mateix horari.

**Peginterferó:** Injecció subcutània a 1 dia a la setmana, a la nit abans d'anar a dormir.

30 min abans de l'administració prengui 1 comprimit de paracetamol 500mg i tregui la injecció de la nevera perquè estigui a temperatura ambient.

### Instruccions d'administració:

Consulteu díptic informatiu de Peginterferó

### Què fer si oblida una dosi o vomita:

**Simeprevir:**

- Si no és pren una dosi de OLYSIO i el pacient ho adverteix en les 12 hores següents a l'hora habitual de la presa, el pacient ha de prendre la dosi omesa de OLYSIO amb aliments al més aviat possible i prendre després la dosi següent de OLYSIO a l'hora habitual prevista.

- Si no és pren una dosi de OLYSIO més de 12 hores després de l'hora habitual de la presa, el pacient no ha de prendre la dosi omesa de OLYSIO i ha de reprendre la presa de OLYSIO amb aliments a l'hora habitual prevista

**Ribavirina:**

- Si falten més de 8 hores per a la següent presa, SI ha de prendre la dosi oblidada.

**Peginterferó:**

- Si han passat 1 o 2 dies després del previst, injecti la dosi oblidada tan aviat possible i continueu amb el calendari inicial.

- Si han passat 3 a 5 dies després del previst, injecti la dosi oblidada tan aviat possible i passi a injectar les dosis següents en intervals de 5 dies fins que recuperi el ritme setmanal inicial.

- Si han passat 6 dies després del previst, ha d'esperar i injectar la dosi al dia següent per mantenir el ritme habitual.

Horaris recomanats	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Simeprevir (1càps.)	■								
Ribavirina (Segons prescripció)		■					■		
Peginterferó (1 injecció setmanal) Posar el dia de la setmana:									■

## ADVERTENCIES I PRECAUCIONS



**Precaucions (al·lèrgies, excipients DO, embaràs, lactància, vacunes en teràpia biològica, etc.).**

- Adopti 1 mesura anticonceptiva (preservatiu) tant si és home o dona i mantingui-la fins sis mesos després d'haver finalitzat el tractament.

- Dones: No ha de prendre aquest medicament si està embarassada o creu que pot estar-ho. Ribavirina pot provocar malformacions al fetus.

### Contraindicació:

- Olysio®/Rebetol®: conté lactosa monohidrat. Els pacients amb intolerància hereditària a galactosa, insuficiència de lactasa de Lapp (insuficiència observada en certes poblacions de Lapònia) o malabsorció de glucosa o galactosa no han de prendre aquest medicament.

- Per més informació consulteu fitxa tècnica.

## Interaccions

Certs medicaments poden interferir en l'efecte del medicament disminuint el seu efecte o incrementant la seva toxicitat per aquest motiu és molt important que el metge o el farmacèutic estigui al corrent del que està prenent. La seva medicació habitual i que el metge /farmacèutic li ha informat que pot continuar prenent durant el tractament amb Simeprevir, Ribavirina i Peginterferó és:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_

**NO PRENGUI CAP ALTRE MEDICAMENT, SUPLEMENT DIETÈTIC O PLANTA MEDICINAL SENSE CONSULTAR ABANS AMB EL SEU METGE O FARMACÈUTIC**

## POSSIBLES EFECTES ADVERSOS



Dermatològics (Pell) (sequedat, envermelliment (rash), picor i caiguda cabell)) i reaccions de: Ús diari de cremes hidratant i emol·lients, banys amb sobres o sabó d'avena, roba poc ajustada, rotar el lloc d'injecció, no massatge a la zona després de la injecció subcutània, tan sols pressioni la zona i/o apliqui fred, limitar exposició al sol. Evitar tints i permanents (en tots cas els menys agressius) i l'excessiva calor a l'assecar-se el cabell.

Fotosensibilitat (reaccions que recorden a les cremades solars, produïdes després de l'exposició a la llum): caldrà utilitzar protectors solars durant el tractament amb OLYSIO de forma habitual.

Digestius (náusees, vòmits, diarrea, hemorroides, aftes bucals): Beure aigua abundantment, evitar begudes alcohòliques i amb cafeïna, menjar més freqüentment i en menys quantitat (4/5 menjars al dia), menjar aliments lleugers (verdura, amanides, peix a la planxa) i amb fibra (fruita i cereal), si presenta sabor metàl·lic provar xocolata o caramels de menta.

Higiene bucal després de cada menjar, utilitzi raspalls suaus i col·lutoris bucals.

Síndrome pseudogripal: Administrar peginterferó abans d'anar al llit, pot prendre paracetamol 500mg cada 6-8h mai sobrepassi els 2g al dia)

Oculars (sequedat ocular, visió borrosa): Neteja sèrum fisiològic o amb llàgrimes artificials

Sexuals: Utilitzar mètodes anticonceptius no hormonal durant el tractament i fins a 6 mesos després d'haver-lo finalitzat.

Cansanci (fatiga, afogament i anèmia): Realitzar exercici moderat.

Alteracions Psiquiàtriques (depressió, ansietat, insomni. Irritabilitat): tècniques de relaxació (ioga) i avisar al metge per si precisa tractament.

Augment dels nivells sanguinis de bilirubina (un indicador de problemes hepàtics) el seu metge farà seguiment a través de les analítiques.

**DAVANT DE QUALSEVOL EFECTE ADVERS GREU I QUE NO CEDEIXI AMB LES RECOMANACIONS GENERALS, CONTACTAR AMB EL SEU METGE O AMB EL SERVEI D'URGÈNCIES**

## CONSERVACIÓ DE OLYSIO



### Conservació del medicament

Simeprevir: Temperatura ambient fins a la data de caducitat.

Rivavirina: Temperatura ambient fins a la data de caducitat.

Peginterferó: Conservar a la nevera (entre 2 ° C i 8 ° C) fins a la data de caducitat

### Advertències

Mantingui els medicaments fora de l'abast dels nens.

Aquest medicament només es pot aconseguir a través del Servei de farmàcia de l'Hospital.

Retorni la medicació sobrant a la farmàcia de l'hospital.

Dipositi les restes del medicament o d'embalatge al punt SIGRE de la farmàcia més propera.

## IMPORTANT

**PRENDRE TOTES LES DOSIS DEL MEDICAMENT PER TAL D'ASSEGURAR-SE L'ÈXIT DEL TRACTAMENT.** Pot ajudar-se d'alarmes (per exemple, alarma del telèfon mòbil) o recordatoris per tal de no oblidar cap presa.

### Dades de la Farmàcia:

Nom de la farmàcia:

Horari:

Telèfon:

Email: