

## Olysio® (Simeprevir) i Sovaldi® (Sofosbuvir)

### 1. Nom comercial i principi actiu:

Olysio® (Simeprevir) i Sovaldi® (Sofosbuvir)

### 2. Què és Simeprevir/Sofosbuvir?

Cada càpsula dura de Olysio® conté 150mg de Simeprevir. Cada comprimit de Sovaldi® conté 400mg de Sofosbuvir.




## POSOLÒGIA



### Com s'ha de prendre?

Un comprimit al dia amb menjar.

El comprimit i la càpsula s'han d'empassar sencers, sense mastegar ni trencar o dissoldre. Mantenir sempre el mateix horari.

Horari	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Simeprevir									
Sofosbuvir									

### Què fer si oblida una dosi o vomita:

Sofosbuvir:

- Si han passat menys de 18 hores des del moment en què pren Sofosbuvir habitualment, ha de prendre el comprimit abans possible. A continuació, prengui la següent dosi a l'hora habitual.
- Si vomita i han passat menys de dues hores de la presa, repetir l'administració.

Simeprevir:

- Si han passat menys de 12 hores des del moment en què pren Simeprevir habitualment, ha de prendre el comprimit abans possible. A continuació, prengui la següent dosi a l'hora habitual.

## ADVERTENCIES I PRECAUCIONS



**Precaucions (al·lèrgies, excipients DO, embaràs, lactància, vacunes en teràpia biològica, etc.).**

- No ha de prendre aquest medicament si està embarassada o creu que pot estar-ho.
- No es recomana durant la lactància.

### Contraindicació:

- Olysio® (Simeprevir): conté lactosa monohidrat. Els pacients amb intolerància hereditària a galactosa, insuficiència de lactasa de Lapp o malabsorció de glucosa o galactosa no han de prendre aquest medicament.
- Per més informació consulteu al seu metge/farmacèutic.

### Interaccions

Certs medicaments poden interferir en l'efecte del medicament disminuint el seu efecte o incrementant la seva toxicitat per aquest motiu és molt important que el metge o el farmacèutic estigui al corrent del que està prenent.

De la seva medicació habitual pot interaccionar amb el tractament amb Simeprevir i Sofosbuvir:

1. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

5. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

6. \_\_\_\_\_

**NO PRENGUI CAP ALTRE MEDICAMENT, SUPLEMENT DIETÈTIC O PLANTA MEDICINAL SENSE CONSULTAR ABANS AMB EL SEU METGE O FARMACÈUTIC**

## POSSIBLES EFECTES ADVERSOS



- Fotosensibilitat (Simeprevir): protecció solar 2 vegades al dia, mínim factor de protecció 15, si apareixen efectes adversos valorar canvi a la nit
- Cansanci (fatiga, afogament i anèmia): Realitzar exercici moderat.
- Cefalea: pot prendre paracetamol ( si no existeix al·lèrgia) 500mg cada 6-8h (mai sobrepassi els 2g al dia).
- Dermatològics (sequedat, envermelliment (rash), picor i caiguda cabell): Ús diari de cremes hidratant i emol·lients, banys amb sobres o sabó d'avena, roba poc ajustada, limitar l'exposició al sol. Evitar tints i permanents (en tots cas els menys agressius) i l'excessiva calor a l'assecar-se el cabell. Caldrà utilitzar protectors solars
- Digestius (nàusees, vòmits, diarrea, estrenyiment): beure aigua abundantment, evitar begudes alcohòliques i amb cafeïna, menjar més freqüentment i en menys quantitat (4/5 menjars al dia), menjar aliments lleugers (verdura, amanides, peix a la planxa) i amb fibra (fruita i cereal).
- Alteracions neurològiques (depressió, ansietat, insomni, irritabilitat, pèrdua de concentració): tècniques de relaxació (ioga) i avisar al metge per si precisa tractament.
- Oculars (sequedat ocular, visió borrosa): Neteja sèrum fisiològic o amb llàgrimes artificials.
- Tos, disnea, congestió nasal
- Pèrdua de gana i pèrdua de pes.
- Dolor muscular, dolor a l'esquena i articulacions

**DAVANT DE QUALSEVOL EFECTE ADVERS GREU I QUE NO CEDEIXI AMB LES RECOMANACIONS GENERALS, CONTACTAR AMB EL SEU METGE O AMB EL SERVEI D'URGÈNCIES:**

## CONSERVACIÓ DE HARVONI / RIBAVIRINA



### Conservació del medicament

Simeprevir i Sofosbuvir conservar a temperatura ambient fins a la data de caducitat.

### Advertències

Mantingui els medicaments fora de l'abast dels nens.

Aquest medicament només es pot aconseguir a través del Servei de farmàcia de l'Hospital.

Retorni la medicació sobrant a la farmàcia de l'hospital, o bé dipositi les restes del medicament o d'embalatge al punt SIGRE de la farmàcia més propera.

## IMPORTANT

**PRENDRE TOTES LES DOSIS DEL MEDICAMENT PER TAL D'ASSEGURAR-SE L'ÈXIT DEL TRACTAMENT.** Pot ajudar-se d'alarmes (per exemple, alarma del telèfon mòbil) o recordatoris per tal de no oblidar cap presa.

### Dades de la Farmàcia:

Nom de la farmàcia:

Horari:

Telèfon:

Email:

Aquest tríptic No conté tota la informació d'aquest medicament i només pretén ser un resum per ajudar al pacient en el seu tractament. Si té qualsevol dubte o necessita més informació contacti amb el seu metge o farmacèutic.

