


Sovaldi® (Sofosbuvir), Olysio® (Simeprevir) i Ribavirina

1. Nom comercial i principi actiu:

Sovaldi® (Sofosbuvir), Olysio® (Simeprevir) i Ribavirina

2. Què és?

Cada càpsula dura de Olysio® conté 150mg de Simeprevir, Sovaldi® cada comprimit conté 400 mg de Sofosbuvir i Ribavirina en càpsules dures de 200mg



POSOLÒGIA





Com s'ha de prendre?

Sofosbuvir: Un comprimit al dia amb menjar.

Simeprevir: Un comprimit al dia amb menjar.

Ribavirina: 2 o 3 comprimits cada 12 hores (segons prescripció mèdica) amb menjar.

Els comprimits i la càpsula s'han d'empassar sencers, sense mastegar, trencar o dissoldre. Mantenir sempre el mateix horari.

NOM MEDICAMENT	8	10	12	14	16	18	20	22	24
RIVABIRINA		
SOFOBUBVIR									
SIMEPREVIR									

Què fer si oblida una dosi o vomita?:

Sofosbuvir:

- Si han passat menys de 18 hores des del moment en que pren Sovaldi habitualment, ha de prendre el comprimit abans possible. A continuació, prengui la següent dosi a l'hora habitual.

- Si vomita i han passat menys de dos hores de la presa anterior, tornar a administrar.

Simeprevir:

- Si han passat menys de 12 hores des del moment en que pren Olysio habitualment, ha de prendre el comprimit abans possible. A continuació, prengui la següent dosi a l'hora habitual.

Ribavirina:

- Si han passat menys de 6 hores des del moment en que pren Ribavirina habitualment, ha de prendre el comprimit. A continuació, prengui la següent dosi a l'hora habitual.

ADVERTENCIES I PRECAUCIONS



Precaucions (al·lèrgies, excipients DO, embaràs, lactància, vacunes en teràpia biològica, etc.).

- Dones: No ha de prendre aquest medicament si està embarassada o creu que pot estar-ho, contraindicada la lactància, adopti una mesura anticonceptiva (preservatiu) durant el tractament i fins a 4 mesos després d'haver-lo finalitzat - Homes: Adopti una mesura anticonceptiva (preservatiu) durant el tractament i fins a 7 mesos després d'haver-lo finalitzat

Contraindicació:

- Olysio®: conté lactosa monohidrat. Els pacients amb intolerància hereditària a galactosa, insuficiència de lactasa de Lapp o malabsorció de glucosa o galactosa no han de prendre aquest medicament.

- Per més informació consulteu fitxa tècnica

Interaccions

Certs medicaments poden interferir en l'efecte del medicament disminuint el seu efecte o incrementant la seva toxicitat per aquest motiu és molt important que el metge o el farmacèutic estigui al corrent del que està prenent. La seva medicació habitual i que el metge /farmacèutic li ha informat que pot continuar prenent durant el tractament amb Sofosbuvir, Simeprevir i Ribavirina és:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

NO PRENGUI CAP ALTRE MEDICAMENT, SUPLEMENT DIETÈTIC O PLANTA MEDICINAL SENSE CONSULTAR ABANS AMB EL SEU METGE O FARMACÈUTIC

POSSIBLES EFECTES ADVERSOS



- Fotosensibilitat (Simeprevir): protecció solar 2 vegades al dia, mínim factor de protecció 15, si apareixen efectes adversos valorar canvi a la nit.
- Cansanci (fatiga, afofament i anèmia): Realitzar exercici moderat.
- Cefalea: pot prendre paracetamol (si no existeix al·lèrgia) 500mg cada 6-8h (mai sobrepassi els 2g al dia).
- Dermatològics (sequedat, envermelliment (rash), picor i caiguda cabell): Ús diari de cremes hidratant i emol·lients, banys amb sobres o sabó d'avena, roba poc ajustada, limitar l'exposició al sol. Evitar tints i permanents (en tots cas els menys agressius) i l'excessiva calor a l'assecar-se el cabell.
- Digestius (náusees, vòmits, diarrea, estrenyiment): beure aigua abundantment, evitar begudes alcohòliques i amb cafeïna, menjar més freqüentment i en menys quantitat (4/5 menjars al dia), menjar aliments lleugers (verdura, amanides, peix a la planxa) i amb fibra (fruita i cereal).
- Alteracions neurològiques (depressió, ansietat, insomni, irritabilitat, pèrdua de concentració): tècniques de relaxació (ioga) i avisar al metge per si precisa tractament.
- Oculars (sequedat ocular, visió borrosa): Neteja sèrum fisiològic o amb llàgrimes artificials.
- Tos, disnea, congestió nasal
- Pèrdua de gana i pèrdua de pes.
- Dolor muscular, dolor a l'esquena i articulacions

DAVANT DE QUALSEVOL EFECTE ADVERS GREU I QUE NO CEDEIXI AMB LES RECOMANACIONS GENERALS, CONTACTAR AMB EL SEU METGE O AMB EL SERVEI D'URGÈNCIES

CONSERVACIÓ



Conservació del medicament

Sofosbuvir, Rivavirina i Simeprevir conservar a temperatura ambient fins a la data de caducitat.

Advertències

Mantingui els medicaments fora de l'abast dels nens.

Aquest medicament només es pot aconseguir a través del Servei de farmàcia de l'Hospital.

Retorni la medicació sobrant a la farmàcia de l'hospital.

Dipositi les restes del medicament o d'embalatge al punt SIGRE de la farmàcia més propera.

IMPORTANT

PRENDRE TOTES LES DOSIS DEL MEDICAMENT PER TAL D'ASSEGURAR-SE L'ÈXIT DEL TRACTAMENT. Pot ajudar-se d'alarmes (per exemple, alarma del telèfon mòbil) o recordatoris per tal de no oblidar cap presa.

Dades de la Farmàcia:

Nom de la farmàcia:

Horari:

Telèfon:

Email: