


Sovaldi® (Sofosbuvir), Ribavirina

1. Nom comercial i principi actiu:

Sovaldi® (Sofosbuvir) i Ribavirina

2. Què és?

Cada comprimit de Sovaldi® conté 400 mg de Sofosbuvir, que es pot prendre conjuntament amb càpsules dures que contenen 200mg de Ribavirina.



POSOLOGIA



Com s'ha de prendre?:

Sofosbuvir: La dosi recomanada és un comprimit una vegada al dia amb aliments.

Ribavirina: 2 o 3 comprimits cada 12 hores (segons prescripció mèdica) amb menjar.

Els comprimits i la càpsula s'han d'empassar sencers, sense mastegar, trencar o dissoldre. Mantenir sempre el mateix horari.

| NOM MEDICAMENT | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
|----------------|--|----|----|----|----|----|-----|----|----|
| RIVABIRINA | ... | | | | | | ... | | |
| SOFOBUBVIR |  | | | | | | | | |

Què fer si oblida una dosi o vomita?:

Sofosbuvir:

- Si han passat menys de 18 hores des del moment en que pren Sofosbuvir habitualment, ha de prendre el comprimit abans possible. A continuació, prengui la següent dosi a l'hora habitual.

- Si vomita i han passat menys de dos hores de la presa anterior, tornanr a administrar

Ribavirina:

- Si han passat menys de 6 hores des del moment en que pren Ribavirina habitualment, ha de prendre el comprimit . A continuació, prengui la següent dosi a l'hora habitual.

ADVERTENCIES I PRECAUCIONS



Precaucions (al·lèrgies, excipients DO, embaràs, lactància, vacunes en teràpia biològica, etc.).

- Dones: No ha de prendre aquest medicament si està embarassada o creu que pot estar-ho, contraindicada la lactància, adopti una mesura anticonceptiva (preservatiu) durant el tractament i fins a 4 mesos després d'haver-lo finalitzat - Homes: Adopti una mesura anticonceptiva (preservatiu) durant tractament i fins a 7 mesos després d'haver-lo finalitzat.

Contraindicació:

- Per més informació consulteu fitxa tècnica

Interaccions

Certs medicaments poden interferir en l'efecte del medicament disminuint el seu efecte o incrementant la seva toxicitat per aquest motiu és molt important que el metge o el farmacèutic estigui al corrent del que està prenent. La seva medicació habitual i que el metge /farmacèutic li ha informat que pot continuar prenent durant el tractament amb Sofosbuvir i Ribavirina és:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

NO PRENGUI CAP ALTRE MEDICAMENT, SUPLEMENT DIETÈTIC O PLANTA MEDICINAL SENSE CONSULTAR ABANS AMB EL SEU METGE O FARMACÈUTIC

POSSIBLES EFECTES ADVERSOS



- Cefalea: Pot prendre paracetamol 500mg cada 6-8h (mai sobrepassi els 2g al dia)
- Digestius (nàusees, vòmits, diarrea, sequetat bucal): Beure aigua abundantment, evitar begudes alcohòliques i amb cafeïna, menjar més freqüentment i en menys quantitat (4/5 menjars al dia), menjar aliments lleugers (verdura, amanides, peix a la planxa) i amb fibra (fruita i cereal).
- Alteracions Psiquiàtriques (depressió, ansietat, insomni, irritabilitat): tècniques de relaxació (ioga) i avisar al metge per si precisa tractament.
- Dermatològics (Pell) (sequetat, envermelliment (rash), picor i caiguda cabell): Ús diari de cremes hidratant i emol·lients, banys amb sobres o sabó d'avena, roba poc ajustada, limitar l'exposició al sol. Evitar tints i permanents (en tots cas els menys agressius) i l'excessiva calor a l'assecar-se el cabell.
- Tos seca irritabilitat
- Pèrdua de gana i de pes
- Dolor muscular, dolor a l'esquena i a les articulacions
- Cansanci (fatiga, afogament i anèmia): Realitzar exercici moderat.
- Oculars (sequetat ocular, visió borrosa) : Neteja sèrum fisiològic o amb llàgrimes artificials

DAVANT DE QUALSEVOL EFECTE ADVERS GREU I QUE NO CEDEIXI AMB LES RECOMANACIONS GENERALS, CONTACTAR AMB EL SEU METGE O AMB EL SERVEI D'URGÈNCIES

CONSERVACIÓ



Conservació del medicament

Sofosbuvir i Rivavirina conservar a temperatura ambient fins a la data de caducitat.

Advertències

Mantingui els medicaments fora de l'abast dels nens.

Aquest medicament només es pot aconseguir a través del Servei de farmàcia de l'Hospital.

Retorni la medicació sobrant a la farmàcia de l'hospital.

Dipositi les restes del medicament o d'embalatge al punt SIGRE de la farmàcia més propera.

IMPORTANT

PRENDRE TOTES LES DOSIS DEL MEDICAMENT PER TAL D'ASSEGURAR-SE L'ÈXIT DEL TRACTAMENT. Pot ajudar-se d'alarmes (per exemple, alarma del telèfon mòbil) o recordatoris per tal de no oblidar cap presa.

Dades de la Farmàcia:

Nom de la farmàcia:

Horari:

Telèfon:

Email:

Aquest tríptic No conté tota la informació d'aquest medicament i només pretén ser un resum per ajudar al pacient en el seu tractament. Si té qualsevol dubte o necessita més informació contacti amb el seu metge o farmacèutic.

