

Incivo® (Telaprevir)

1. Nom comercial i principi actiu

Incivo® (Telaprevir)

2. Què es TELAPREVIOR?

Cada comprimit recobert amb pel·lícula de Incivo® conté 375mg de Telaprevir



POSOLÒGIA



Com s'ha de prendre INCIVO:


Telaprevir: S'administra via oral. La dosi recomanada pot ser: 2 comprimits (750mg) cada 8 hores ó 3 comprimits (1125mg) cada 12 hores (segons prescripció mèdica), amb aliments greixos (pa amb oli, galetes amb xocolata, un got de llet sencera, formatges curats, fruits secs, gelat ...). El menjar és important per aconseguir els nivells adequats del medicament al seu cos.

Ribavirina: 2 o 3 comprimits cada 12 hores (segons prescripció mèdica) amb una mica de menjar.

Els comprimits s'han d'empassar sencers, sense mastegar, trencar o dissoldre. Mantenir sempre el mateix horari.

Peginterferó: Injecció subcutània a 1 dia a la setmana, a la nit abans d'anar a dormir.

30 min abans de l'administració prengui 1 comprimit de paracetamol 500mg i tregui la injecció de la nevera perquè estigui a temperatura ambient.

Horaris recomanats	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Telaprevir (segons prescripció)									
Ribavirina (Segons prescripció)			
Peginterferó (1 injecció setmanal) Posar el dia de la setmana:									

Instruccions d'administració

Consulteu díptic informatiu de Peginterferó

Què fer si oblida una dosi o vomita:

Telaprevir:

- Si falten més de 4 hores per a la següent presa, SI ha de prendre la dosi oblidada.

Ribavirina:

- Si falten més de 8 hores per a la següent presa, SI ha de prendre la dosi oblidada.

Peginterferó:

- Si han passat 1 o 2 dies després del previst, injecti la dosi oblidada tan aviat possible i continueu amb el calendari inicial.

- Si han passat 3 a 5 dies després del previst, injecti la dosi oblidada tan aviat possible i passi a injectar les dosis següents en intervals de 5 dies fins que recuperi el ritme setmanal inicial.

- Si han passat 6 dies després del previst, ha d'esperar i injectar la dosi al dia següent per mantenir el ritme habitual.

ADVERTENCIES I PRECAUCIONS



Precaucions (al·lèrgies, excipients DO, embaràs, lactància, vacunes en teràpia biològica, etc.).

- Adopti 1 mesura anticonceptiva (preservatiu) tant si és home o dona i mantingui-la fins sis mesos després d'haver finalitzat el tractament.

- Dones: No ha de prendre aquest medicament si està embarassada o creu que pot estar-ho. Ribavirina pot provocar malformacions al fetus.

Contraindicació:

- Rebetol®: conté lactosa monohidrat. Els pacients amb intolerància hereditària a galactosa, insuficiència de lactasa de Lapp (insuficiència observada en certes poblacions de Lapònia) o malabsorció de glucosa o galactosa no han de prendre aquest medicament.

Per més informació consulteu fitxa tècnica

Interaccions

Certs medicaments poden interferir en l'efecte del medicament disminuint el seu efecte o incrementant la seva toxicitat per aquest motiu és molt important que el metge o el farmacèutic estigui al corrent del que està prenent. La seva medicació habitual i que el metge /farmacèutic li ha informat que pot continuar prenent durant el tractament amb Telaprevir, Ribavirina i Peginterferó és:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

NO PRENGUI CAP ALTRE MEDICAMENT, SUPLEMENT DIETÈTIC O PLANTA MEDICINAL SENSE CONSULTAR ABANS AMB EL SEU METGE O FARMACÈUTIC

POSSIBLES EFECTES ADVERSOS



Dermatològics (Pell) (sequedat, envermelliment (rash), picor i caiguda cabell): Ús diari de cremes hidratant i emol·lients, banys amb sobres o sabó d'avena, roba poc ajustada, rotar el lloc d'injecció, no massatge a la zona després de la injecció subcutània, tan sols pressioni la zona i/o apliqui fred, limitar exposició al sol. Evitar tints i permanents (en tots cas els menys agressius) i l'excessiva calor a l'assecar-se el cabell.

Digestius (náusees, vòmits, diarrea, hemorroides, aftes bucal): Beure aigua abundantment, evitar begudes alcohòliques i amb cafeïna, menjar més freqüentment i en menys quantitat (4/5 menjars al dia), menjar aliments lleugers (verdura, amanides, peix a la planxa) i amb fibra (fruita i cereal), si presenta sabor metàl·lic provar xocolata o caramels de menta. Higiene bucal després de cada menjar, utilitzi raspalls suaus i col·lutoris bucal.

Síndrome pseudogripal: Administrar peginterferó abans d'anar al llit, pot prendre paracetamol 500mg cada 6-8h mai sobrepassi els 2g al dia

Oculars (sequedat ocular, visió borrosa): Neteja sèrum fisiològic o amb llàgrimes artificials

Sexuals: Utilitzar mètodes anticonceptius no hormonal durant el tractament i fins a 6 mesos després d'haver-lo finalitzat.

Cansanci (fatiga, afogament i anèmia): Realitzar exercici moderat.

Alteracions Psiquiàtriques (depressió, ansietat, insomni. Irritabilitat): tècniques de relaxació (ioga) i avisar al metge per si precisa tractament.

DAVANT DE QUALESVOL EFECTE ADVERS GREU I QUE NO CEDEIXI AMB LES RECOMANACIONS GENERALS, CONTACTAR AMB EL SEU METGE O AMB EL SERVEI D'URGÈNCIEST

CONSERVACIÓ DE INCIVO



Conservació del medicament

Telaprevir: Temperatura ambient fins a la data de caducitat.

Rivavirina: Temperatura ambient fins a la data de caducitat.

Peginterferó: Conservar a la nevera (entre 2 ° C i 8 ° C) fins a la data de caducitat.

Advertències

Mantingui els medicaments fora de l'abast dels nens.

Aquest medicament només es pot aconseguir a través del Servei de farmàcia de l'Hospital.

Retorni la medicació sobrant a la farmàcia de l'hospital.

Dipositi les restes del medicament o d'embalatge al punt SIGRE de la farmàcia més propera.

IMPORTANT

PRENDRE TOTES LES DOSIS DEL MEDICAMENT PER TAL D'ASSEGURAR-SE L'ÈXIT DEL TRACTAMENT.

Pot ajudar-se d'alarmes (per exemple, alarma del telèfon mòbil) o recordatoris per tal de no oblidar cap presa.

Dades de la Farmàcia:

Nom de la farmàcia:

Horari:

Telèfon:

Email: