


## Orencia® plomes

### 1. Nom comercial

Orencia® 125mg ploma

### 2. Principi Actiu

Abatacept



## POSOLÓGIA



### Com s'ha de prendre ORENCIA® plomes?




- Es pot iniciar amb o sense pauta inicial endovenosa.
  - La pauta de manteniment és d'una ploma de 125 mg cada setmana.
- Aquesta pauta queda subjecte a possibles modificacions segons criteri mèdic.

#### Instruccions d'administració

S'administra per via subcutània (sota la pell), a l'abdomen (a 5 cm del melic) o a la part anterior de les cuixes. És convenient rotar les zones d'injecció en cada administració. No administrar en zones envermellides, endurides o amb dolor. Es recomana treure el medicament de la nevera 30 minuts abans de l'administració per a que sigui menys dolorosa. No agitar ni escalfar el medicament abans de l'administració. Cada dispositiu és d'un sol ús.

Procediment per a l'administració:

1. Rentar-se les mans amb aigua i sabó.
2. Desinfectar la zona d'administració amb una gassa i alcohol o povidona iodada. Deixar assecar.
3. Treure el protector de l'agulla i col·locar la ploma de manera que es pugui veure el visor i estigui en un angle de 90° respecte el lloc d'injecció.
4. Amb l'altra mà, pessigar la zona d'administració.
5. Pressionar sobre la pell i mantenir durant 15 segons. Esperar a que l'indicador blau deixi de moure's.
6. Pot aparèixer un lleu sagnat en el lloc d'injecció. Pressioni la zona amb una bola de cotó o gasa.
9. Dipositi la ploma utilitzada en un contenidor d'objectes punxants fora de l'abast dels nens



### Què fer si oblida una dosi?

Si s'oblida una dosi però està dins de l'interval de 3 dies des de la data prevista, es pot administrar la dosi oblidada i continuar amb la pauta original. Si la dosi s'omet durant més de 3 dies, consultar al metge per valorar cada cas.

## ADVERTENCIES I PRECAUCIONS



### Precaucions (al·lèrgies, excipients DO, embaràs, lactància, vacunes en teràpia biològica, etc.).

Si presenta alguna infecció no administrar-se el tractament i contactar amb el seu metge.

En cas d'estar pendent d'algun procediment quirúrgic o extracció dental, es recomana programar-lo amb antel·lació per si s'ha de suspendre temporalment el medicament.

No es recomana l'administració de vacunes de virus vius: xarampió, rubèola, parotiditis (triple vírica), varicel·la, febre groga, poliomielitis oral (Sabin), tuberculosi (BCG), febre tifoidea i còlera oral. Consultar prèviament amb el seu metge.

A les dones en edat fèrtil se'ls recomana emprar algun mètode anticonceptiu adequat per evitar l'embaràs durant el tractament amb Orenzia® i continuar la contracepció fins almenys 14 setmanes després d'haver finalitzat Orenzia®.

**No es recomana la lactància durant el tractament amb Orenzia®.**

Certs medicaments poden interferir en l'efecte del medicament disminuint el seu efecte o incrementant la seva toxicitat. Per aquest motiu és molt important que el metge o el farmacèutic estigui al corrent del que està prenent.

**NO PRENGUI CAP ALTRE MEDICAMENT, SUPLEMENT DIETÈTIC O PLANTA MEDICINAL SENSE CONSULTAR ABANS AMB EL SEU METGE O FARMACÈUTIC**

## POSSIBLES EFECTES ADVERSOS



- Cefalees: es pot prendre un analgèsic com paracetamol
- Nàusees, dolor abdominal, diarrea i dispepsia: es recomana menjar poc a poc i en petites quantitats
- Infeccions de les vies respiratòries superiors (incloent nasofaringitis i sinusitis)
- Hipertensió: es recomana controlar-la periòdicament
- Erupció cutània
- Fatiga
- Reaccions en el lloc d'injecció: rotar el lloc d'administració i en cas de dolor, administrar fred sobre la zona

Davant d'una possible reacció al·lèrgica o de qualsevol efecte advers greu i que no cedeixi amb les recomanacions generals, contactar amb el seu metge o amb el servei d'Urgències.

## CONSERVACIÓ DE ORENCIA® PLOMA PRECARREGADA



### Conservació del medicament

S'ha de conservar en nevera (entre 2°C i 8°C). No es pot congelar i s'ha de protegir de la llum.

Un cop s'ha tret de la nevera, es pot mantenir a temperatura ambient (25°C) durant un màxim de 8 hores. Si ha passat més del temps recomanat, rebutjar la ploma

### Advertències

Mantingui els medicaments fora de l'abast dels nens.

Aquest medicament només es pot aconseguir a través del Servei de Farmàcia de l'hospital.

Retorni la medicació sobrant a la farmàcia de l'hospital.

### IMPORTANT

PRENDRE TOTES LES DOSIS DEL MEDICAMENT PER TAL D'ASSEGURAR-SE L'ÈXIT DEL TRACTAMENT. Pot ajudar-se d'alarmes (per exemple, alarma del telèfon mòbil) o recordatoris per tal de no oblidar cap presa.

### Dades de la Farmàcia:

Nom de la farmàcia:

Horari:

Telèfon:

Email: