

Cimzia®

1. Nom comercial

Cimzia® 200 mg en xeringa precarregada

2. Principi Actiu

Certolizumab pegol



POSOLOGIA



Com s'ha de prendre CIMZIA


- Inducció: Posologia: _____ xeringa c/ _____ durant: _____

- Manteniment: Posologia: _____ xeringa c/ _____

Aquesta pauta queda subjecte a possibles modificacions segons criteri mèdic.


Instruccions d'administració

S'administra per via subcutània (sota la pell), a l'abdomen (a 5 cm del melic) o cuixes. És convenient rotar les zones d'injecció en cada administració, deixant almenys 3 cm de distància del lloc de l'última punxada. No administrar en zones envermellides, endurides o amb dolor. Es recomana treure el medicament de la nevera 30 min abans de l'administració per tal que sigui menys dolorosa. No agitar ni escalfar el medicament abans de l'administració. Cada dispositiu és d'un sol ús.



Procediment per a l'administració:

1. Rentar-se les mans amb aigua i sabó.
2. Desinfectar la zona d'administració amb una gasa i alcohol o povidona iodada. Deixar assecar.
3. Comprovar que la solució de la xeringa és clara, incolora o de color groc pàl·lid.
4. Retirar la tapa de la xeringa sense tocar l'èmbol.
5. Pessigar la zona d'administració per aconseguir una superfície més estable.
6. Introdur l'agulla a la zona d'administració amb un angle de 45° amb seguretat.
7. Administrar el medicament lentament.
8. Retirar l'agulla suaument.
9. Pressionar lleugerament amb una gasa la zona d'administració sense fregar-la.
10. No tornar a tapar la xeringa per evitar risc de punxada.



Què fer si oblida una dosi?

Si oblida una dosi cal administrar-la tan aviat com ho recordi, però no dobli la dosi següent. Després continuar administrant les dosis posteriors segons la freqüència habitual.

ADVERTENCIES I PRECAUCIONS



Precaucions (al·lèrgies, excipients DO, embaràs, lactància, vacunes en teràpia biològica, etc.).

Precaucions (al·lèrgies, excipients DO, embaràs, lactància, vacunes en teràpia biològica, etc.). Si presenta alguna infecció no administrar-se el tractament i contactar amb el seu metge.

En cas d'estar pendent d'algun procediment quirúrgic o extracció dental, es recomana programar-lo amb antelació per si s'ha de suspendre temporalment el medicament.

No es recomana l'administració de les vacunes de virus vius: xarampió, rubèola, paroditis (triple vírica), varicel·la, febre groga, poliomielitis oral (Sabin), tuberculosi (BCG), febre tifoidea i còlera oral. Consultar prèviament amb el seu metge.

A les dones en edat fèrtil se'ls recomana emprar algun mètode anticonceptiu adequat per evitar l'embaràs durant

el tractament amb certolizumab i almenys fins a 5 mesos després d'haver finalitzat certolizumab.
Consultar amb el seu metge abans d'iniciar la lactància.

Interaccions

Certs medicaments poden interferir en l'efecte del medicament disminuint el seu efecte o incrementant la seva toxicitat per aquest motiu és molt important que el metge o el farmacèutic estigui al corrent del que està prenent.

NO PRENGUI CAP ALTRE MEDICAMENT, SUPLEMENT DIETÈTIC O PLANTA MEDICINAL SENSE CONSULTAR ABANS AMB EL SEU METGE O FARMACÈUTIC.

POSSIBLES EFECTES ADVERSOS



A l'igual que tots els medicaments, certolizumab pot produir efectes adversos, encara que no han d'aparèixer tots, ni tampoc han d'afectar a totes les persones.

Els més freqüents són:

- Reacció o dolor en la zona d'administració (inflor, envermelliment, picor...). Alternar el lloc on s'administri el medicament, i en cas de dolor, aplicar fred sobre la zona.
- Mal de cap (migronya), debilitat, febre, dolor i malestar general. Es pot prendre un analgèsic com paracetamol.
- Major susceptibilitat a patir infeccions. Prendre mesures higièniques bàsiques.
- Infeccions respiratòries com un refredat, nasofaringitis, faringitis, sinusitis, pneumonia.
- Nàusees. Es recomana menjar poc a poc i petites quantitats (5-6 vegades/dia) evitant menjar amb elevat contingut gras.
- Augment de la tensió arterial. Es recomana controlar-la periòdicament.
- Reacció al·lèrgica: inflor de la cara, llavis, boca o gola que pot causar dificultat per empassar o respirar, erupció cutània, inflor de peus, mans, turmells i picor.

Davant d'una possible reacció al·lèrgica o de qualsevol efecte advers greu que no cedeixi amb les recomanacions generals, contactar amb el seu metge o amb el servei d'urgències.

CONSERVACIÓ DE HUMIRA PEN



Conservació del medicament

S'ha de conservar en la nevera (entre 2°C i 8°C). No es pot congelar i s'ha de protegir de la llum.

No utilitzar aquest medicament després de la data de caducitat que s'indica a l'envàs.

Advertències

El medicament s'ha de mantenir fora de l'abast dels nens.

Aquest medicament només es pot aconseguir a través del Servei de farmàcia de l'Hospital.

La medicació sobrant s'ha de retornar a la farmàcia de l'hospital.

IMPORTANT

PRENDRE TOTES LES DOSIS DEL MEDICAMENT PER TAL D'ASSEGURAR-SE L'ÈXIT DEL TRACTAMENT. Pot ajudar-se d'alarmes (per exemple, alarma del telèfon mòbil) o recordatoris per tal de no oblidar cap presa.

Dades de la Farmàcia:

Nom de la farmàcia:

Horari:

Telèfon:

Email: