

Enbrel® 25 mg i Enbrel® 50mg xeringa precarregada

1. Nom comercial

Enbrel® 25 mg i Enbrel® 50mg xeringa precarregada

2. Principi Actiu

Etanercept



POSOLÓGIA



Com s'ha de prendre ENBREL

Posologia: _____ xeringa c/ _____



Aquesta pauta queda subjecte a possibles modificacions segons criteri mèdic.

Instruccions d'administració

S'administra via subcutània (sota la pell), a l'abdomen (a 5 cm Del melic) o cuixes. És convenient rotar les zones d'injecció en cada administració, deixant almenys 3cm de distància del lloc de l'última punxada. No administrar en zones envermellides , endurides o amb dolor. Es recomana treure el medicament de la nevera 30min abans de l'administració per tal que sigui menys dolorosa. No agitar ni escalfar el medicament abans de l'administració. Cada dispositiu és d'un sol ús.

Procediment per l' administració:

1. Rentar-se les mans amb aigua i sabó.
2. Desinfectar la zona d' administració amb gassa i alcohol o povidona iodada. Deixar assecar.
3. Comprovar que la solució de la xeringa és clara, incolora o de color groc pàl·lid
4. Retirar la tapa de la xeringa sense tocar l' èmbol.
5. Pessigar la zona d' administració per aconseguir una superfície més estable.
6. Introduir l' agulla a la zona d' administració amb un angle de 45° amb seguretat.
7. Quan l'agulla estigui totalment inserida, deixar anar la pell pessigada.
8. Administrar el medicament lentament.
9. Retirar l'agulla suaument.
10. Pressionar lleugerament amb una gassa la zona d'administració sense fregar-la.
11. No tornar tapar la xeringa per evitar risc de punxada.



Què fer si oblida una dosi?

Si oblida una dosi cal administrar-la tan aviat com ho recordi, però no dobli la dosi següent. Després continuar administrant les dosis posteriors segons la freqüència habitual.

ADVERTENCIES I PRECAUCIONS



Precaucions (al·lèrgies, excipients DO, embaràs, lactància, vacunes en teràpia biològica, etc.).

Si presenta alguna infecció no administrar-se el tractament i contactar amb el seu metge.

En cas d'estar pendent d'algun procediment quirúrgic o extracció dental, es recomana programar-lo amb antelació per si s'ha de suspendre temporalment el medicament.

No es recomana l'administració de vacunes de virus vius: xarampió, rubéola, parotiditis (triple vírica), varicel·la, febre groga, poliomelitis oral (Sabin), tuberculosi (BCG), febre tifoidea i còlera oral. Consultar prèviament amb el seu metge

La tapa de l'agulla conté làtex. No s'ha de manipular en cas d' al·lèrgia.

A les dones en edat fèrtil se'ls recomana emprar algun mètode anticonceptiu adequat per evitar l'embaràs durant

el tractament amb Embrel i continuar la contracepció fins almenys 3 setmanes després d'haver finalitzat Embrel. No es recomana la lactància durant el tractament.

Interaccions

Certs medicaments poden interferir en l'efecte del medicament disminuint el seu efecte o incrementant la seva toxicitat per aquest motiu és molt important que el metge o el farmacèutic estigui al corrent del que està prenent.

NO PRENGUI CAP ALTRE MEDICAMENT, SUPLEMENT DIETÈTIC O PLANTA MEDICINAL SENSE CONSULTAR ABANS AMB EL SEU METGE O FARMACÈUTIC.

POSSIBLES EFECTES ADVERSOS



A l'igual que tots els medicaments, Embrel pot produir efectes adversos, encara que no han d'aparèixer tots, ni tampoc han d'afectar a totes les persones.

Els més freqüents són:

- Reacció o dolor en el lloc de la punció (inflor, envermelliment, picor...). Alternar el lloc on s'administri el medicament, i en cas de dolor, aplicar fred sobre la zona.
- Mal de cap (migranya), debilitat, febre, dolor i malestar general. Es pot prendre un analgèsic com paracetamol.
- Major susceptibilitat a patir infeccions. Prendre mesures higièniques bàsiques
- Infeccions respiratòries com un refredat, nasofaringitis, faringitis, sinusitis, pneumonia.
- Dolor abdominal, nàusees i vòmits. Es recomana menjar a poc a poc i petites quantitats (5-6 vegades/dia) evitant menjar amb elevat contingut gras.
- Augment de la tensió arterial. Es recomana controlar-la periòdicament.
- Major susceptibilitat a patir infeccions. Prendre mesures higièniques bàsiques.
- Reacció al·lèrgica: inflor de la cara, llavis, boca o gola que pot causar dificultat per empassar o respirar, erupció cutània, inflor de peus, mans, turmells i picor.

Davant d'una possible reacció al·lèrgica o qualsevol efecte advers greu que no cedeixi amb les recomanacions generals, contactar amb el seu metge o amb el servei d'urgències.

CONSERVACIÓ DE HUMIRA PEN



Conservació del medicament

S'ha de conservar en nevera (entre 2°C i 8°C). No es pot congelar i s'ha de protegir de la llum.

Un cop s'ha tret de la nevera, es pot mantenir a temperatura ambient (25°C) durant un període màxim de 4 setmanes. Si no s'ha utilitzat al llarg d'aquestes 4 setmanes, cal tirar la xeringa.

No utilitzar aquest medicament després de la data de caducitat que s'indica a l'envàs.

Advertències

Mantingui els medicaments fora de l'abast dels nens.

Aquest medicament només es pot aconseguir a través del Servei de Farmàcia de l'Hospital.

Retorni la medicació sobrant a la farmàcia de l'hospital.

IMPORTANT

PRENDRE TOTES LES DOSIS DEL MEDICAMENT PER TAL D'ASSEGURAR-SE L'ÈXIT DEL TRACTAMENT. Pot ajudar-se d'alarmes (per exemple, alarma del telèfon mòbil) o recordatoris per tal de no oblidar cap presa.

Dades de la Farmàcia:

Nom de la farmàcia:

Horari:

Telèfon:

Email: