

Stelara® 45 mg xeringa precarregada

1. Nom comercial

Stelara® 45 mg xeringa precarregada

2. Principi Actiu

Ustekinumab



POSOLOGIA



Com s'ha de prendre STELARA

Inducció: Posologia: _____ xeringa c/ _____ durant: _____

Manteniment: Posologia: _____ xeringa c/ _____

Aquesta pauta queda subjecte a possibles modificacions segons criteri mèdic.


Instruccions d'administració

S'administra la xeringa per via subcutània (sota la pell), a l'abdomen o cuixes (a 5 cm del melic). És convenient rotar les zones d'injecció en cada administració, deixant almenys 3cm de distància del lloc de l'última punxada. No administrar en zones envermellides, endurides o amb dolor. Es recomana treure el medicament de la nevera 30min abans de l'administració per tal que sigui menys dolorosa. No agitar ni escalfar el medicament abans de l'administració.

Cada dispositiu és d'un sol ús

Procediment per a l'administració:

1. Rentar-se les mans amb aigua i sabó.
2. Desinfectar la zona d'administració amb una gassa i alcohol o povidona iodada. Deixar assecar.
3. Comprovar que la solució de la xeringa és clara, incolora o de color groc pàl·lid.
4. Retirar la tapa de la xeringa sense tocar l'èmbol.
5. Pessigar la zona d'administració per aconseguir una superfície més estable.
6. Introduir l'agulla a la zona d'administració amb un angle de 45° amb seguretat.
7. Administrar el medicament lentament.
8. Mantenir la pressió sobre l'èmbol, retirar l'agulla suaument i deixar anar la pell. L'agulla quedarà completament coberta pel protector.
9. Pressionar lleugerament amb una gassa la zona d'administració sense fregar-la.



Què fer si oblida una dosi?

Si oblida una dosi, consultar al seu metge o farmacèutic. No es pot doblar la dosi per compensar l'oblit.

ADVERTENCIES I PRECAUCIONS



Precaucions (al·lèrgies, excipients DO, embaràs, lactància, vacunes en teràpia biològica, etc.).

Si presenta alguna infecció no administrar-se el tractament i contactar amb el seu metge.

En cas d'estar pendent d'algun procediment quirúrgic o extracció dental, es recomana programar-lo amb antelació per si s'ha de suspendre temporalment el medicament.

Abans d'administrar una vacuna de virus vius o bacteries vives (xarampió, rubèola, paroditis (triple vírica), varicel·la, febre groga, poliomièlitis oral (Sabin), tuberculosi (BCG), febre tifoidea i còlera oral) s'haurà d'interrompre el tractament amb ustekinumab durant almenys 15 setmanes després des de la última dosi i es podrà reprendre com a mínim 2 setmanes després de la vacunació.

La tapa de l'agulla conté làtex. No s'ha de manipular en cas d'al·lèrgia.

Les dones en edat fèrtil han d'utilitzar mètodes anticonceptius per prevenir l'embaràs durant el tractament i fins almenys 15 setmanes després del mateix.

No es recomana la lactància durant el tractament amb ustekinumab.

Interaccions

Certs medicaments poden interferir en l'efecte del medicament disminuint el seu efecte o incrementant la seva toxicitat per aquest motiu és molt important que el metge o el farmacèutic estigui al corrent del que està prenent.

NO PRENGUI CAP ALTRE MEDICAMENT, SUPLEMENT DIETÈTIC O PLANTA MEDICINAL SENSE CONSULTAR ABANS AMB EL SEU METGE O FARMACÈUTIC

POSSIBLES EFECTES ADVERSOS



Al igual que tots els medicaments, ustekinumab pot produir efectes adversos, encara que no han d'aparèixer tots, ni tampoc han d'afectar a totes les persones.

Els més freqüents són:

- Reacció o dolor en la zona d'administració (inflor, envermelliment, picor...). Alternar el lloc on s'administri el medicament, i en cas de dolor, aplicar fred sobre la zona.
- Mal de cap, debilitat, febre, dolor i malestar general. Es pot prendre un analgèsic com paracetamol.
- Major susceptibilitat a patir infeccions. Prendre mesures higièniques bàsiques.
- Infeccions respiratòries com un refredat, nasofaringitis, faringitis, sinusitis, pneumonia.
- Dolor abdominal, nàusees i vòmits. Es recomana menjar a poc a poc i petites quantitats (5-6 vegades/dia) evitant menjar amb elevat contingut gras.
- Reacció al·lèrgica: inflor de la cara, llavis, boca o gola que pot causar dificultat per empassar o respirar, erupció cutània, inflor de peus, mans, turmells i picor.

Davant d'una possible reacció al·lèrgica o qualsevol efecte advers greu i que no cedeixi amb les recomanacions generals, contactar amb el seu metge o amb el servei d'urgències.

CONSERVACIÓ DE STELARA



Conservació del medicament

S'ha de conservar en nevera (entre 2°C i 8°C). No es pot congelar i s'ha de protegir de la llum.

No utilitzar aquest medicament després de la data de caducitat que s'indica a l'envàs.

Advertències

El medicament s'ha de mantenir fora de l'abast dels nens.

Aquest medicament només es pot aconseguir a través del Servei de Farmàcia de l'Hospital.

La medicació sobrant s'ha de retornar a la farmàcia de l'hospital.

IMPORTANT

PRENDRE TOTES LES DOSIS DEL MEDICAMENT PER TAL D'ASSEGURAR-SE L'ÈXIT DEL TRACTAMENT. Pot ajudar-se d'alarmes (per exemple, alarma del telèfon mòbil) o recordatoris per tal de no oblidar cap presa.

Dades de la Farmàcia:

Nom de la farmàcia:

Horari:

Telèfon:

Email: