

Ziagen®

1. Nom comercial i principi actiu 1

Ziagen® (Abacavir)

2. Què és ZIAGEN?

Ziagen® conté abacavir 300mg en forma de comprimits i és un fàrmac antiviral



POSOLOGIA



Com s'ha de prendre ZIAGEN

Ziagen s'administra via oral. Cada comprimit de Ziagen conté 300 mg d'abacavir.

La dosi diària recomanada és de 600 mg. Es pot prendre un comprimit de Ziagen cada 12 hores o bé, dos comprimits un cop al dia. Segueixi les indicacions del seu metge relacionades amb el seu tractament.

Pot prendre els comprimits amb o sense aliments, però ha d'empassar-los sencers, sense partir ni mastegar. En cas necessari, pot partir els comprimits i barrejar-los amb una petita quantitat d'aliment o incorporar-los a un got d'aigua.

Haurà de prendre immediatament la dosi.

Què fer si oblida una dosi?

Si oblida una dosi, l'ha de prendre el més aviat possible a menys que estigui més a prop de la següent dosi. En aquest cas, no prengui el comprimit oblidat i continuï amb el seu horari habitual.

Mai prengui una dosi doble per compensar un oblit.

ADVERTENCIES I PRECAUCIONS



Precaucions (al·lèrgies, excipients DO, embaràs, lactància, vacunes en teràpia biològica, etc.).

Aquest medicament no redueix el risc de transmissió del VIH o Hepatitis B mitjançant contacte sexual o contaminació sanguínia. Es recomana utilitzar mètodes de barrera (preservatiu) i prendre mesures apropiades per evitar el contagi del VIH a altres persones.

Ha d'avisar al seu metge si està embarassada o creu que pot estar-ho, així com si quedés embarassada durant el tractament. Avisi al seu metge si té algun fill a qui estigui donant el pit.

Interaccions

Certs medicaments poden interferir en l'efecte del medicament disminuint el seu efecte o incrementant la seva toxicitat per aquest motiu és molt important que el metge o el farmacèutic estigui al corrent del que està prenent. La seva medicació habitual i que el metge /farmacèutic li ha informat que pot continuar prenent durant el tractament amb Ziagen és:

NO PRENGUI CAP ALTRE MEDICAMENT, SUPLEMENT DIETÈTIC O PLANTA MEDICINAL SENSE CONSULTAR ABANS AMB EL SEU METGE O FARMACÈUTIC

POSSIBLES EFECTES ADVERSOS



Gastrointestinals: nàusees, vòmits, diarrees.

Altres: pèrdua de la gana, mal de cap, cansament.

En alguns malalts por aparèixer una reacció al·lèrgica que pot arribar a ser greu. Els símptomes més freqüents són: taques o vermellor a la pell i febre. També pot aparèixer sensació de cansament excessiu, dificultat per respirar, nàusees amb vòmits, diarrees o mal d'estómac. Si apareguessin aquests símptomes, comunicuï-ho al seu metge immediatament.

Si el seu metge ha interromput el tractament per aparició d'aquesta reacció al·lèrgica, mai torni a prendre Ziagen® o qualsevol altre fàrmac que contengui abacavir (Trizivir®, Kivexa®).

Davant de qualsevol efecte advers greu i que no cedeixi amb les recomanacions generals, contactar amb el seu metge o amb el servei d'urgències

CONSERVACIÓ DE ZIAGEN



Conservació del medicament

Ziagen® s'ha de conservar a temperatura ambient, en un lloc fresc i sec. Els comprimits s'han de guardar a l'envàs original, ben tancat.

Advertències

Mantingui els medicaments fora de l'abast dels nens.

Aquest medicament només es pot aconseguir a través del Servei de farmàcia de l'Hospital.

Retorni la medicació sobrant a la farmàcia de l'hospital.

Dipositi les restes del medicament o d'embalatge al punt SIGRE de la farmàcia més propera.

IMPORTANT

PRENDRE TOTES LES DOSIS DEL MEDICAMENT PER TAL D'ASSEGURAR-SE L'ÈXIT DEL TRACTAMENT.

Pot ajudar-se d'alarmes (per exemple, alarma del telèfon mòbil) o recordatoris per tal de no oblidar cap presa.

Dades de la Farmàcia:

Nom de la farmàcia:

Horari:

Telèfon:

Email: