

## Kivexa®

### 1. Nom comercial i principi actiu

KIVEXA® (Abacavir/Lamivudina)

### 2. Què és KALETRA?

Kivexa® és un medicament antiretroviral que conté Abacavir 600mg/Lamivudina 300mg en forma de comprimits recoberts.



## POSOLOGIA



### Com s'ha de prendre KIVEXA

Posologia: \_\_\_\_\_ comprimit cada \_\_\_\_ h ( \_ - \_ - \_ )

Cal que prengui els comprimits sencers amb un got d'aigua. Els pot prendre amb o sense aliments.

### Què fer si oblida una dos?

Si oblida prendre una dosi, prengui-la tan bon aviat com sigui possible, sempre que hagin passat menys de \_\_\_\_ hores i després continuï amb la posologia habitual.

No prengui MAI una dosi doble per compensar les dosis oblidades.

Si presenta vòmits i en el seu contingut observa els comprimits/càpsules sencers (habitualment < 2h post ingesta) torni a prendre el medicament. Si no és així, eviti repetir dosi i esperi a la següent presa.

## ADVERTENCIES I PRECAUCIONS



### Precaucions (al·lèrgies, excipients DO, embaràs, lactància, vacunes en teràpia biològica, etc.).

Precaucions (al·lèrgies, excipients DO, embaràs, lactància, vacunes en teràpia biològica, etc.).

#### Embaràs:

Les dades actualment disponibles en quant a ús de Abacavir i/o Lamivudina durant l'embaràs semblen no indicar risc de malformacions congènites en el fetus. Tot i així, si està prenent Kivexa i es vol quedar embarassada, consulti amb el seu metge.

#### Lactància:

Abacavir i Lamivudina s'excreten a través de la llet materna. Es recomana en general, en mares infectades pel VIH, evitar donar el pit per minimitzar el risc de transmissió de la infecció al nadó.

No prendre aquest medicament en cas que tingui al·lèrgies a qualsevol dels seus components.

Els comprimits de Kivexa contenen l'excipient E110 (Amarillo anaranjado S).

#### Interaccions

Certs medicaments poden interferir en l'efecte del medicament disminuint el seu efecte o incrementant la seva toxicitat per aquest motiu és molt important que el metge o el farmacèutic estigui al corrent del que està prenent. La seva medicació habitual i que el metge /farmacèutic li ha informat que pot continuar prenent durant el tractament amb KIVEXA® és:

**NO PRENGUI CAP ALTRE MEDICAMENT, SUPLEMENT DIETÈTIC O PLANTA MEDICINAL SENSE CONSULTAR ABANS AMB EL SEU METGE O FARMACÈUTIC**

## POSSIBLES EFECTES ADVERSOS



Una reacció poc freqüent però que pot ser important és la hipersensibilitat cutània a Kivexa.  
**CAL QUE ES POSI EN CONTACTE AMB AL SEU METGE SI:**

- Té una erupció cutània (més freqüent en les 6 primeres setmanes de tractament) i/o
- Presenta un o més dels següents símptomes:
- Febre
- Tos, dificultat respiratòria, mal de coll.
- Malestar general, dolors musculars, cansament exagerat.

Davant de qualsevol efecte advers que no cedeixi amb les recomanacions generals, contactar amb el seu metge o amb el servei d'urgències.

## CONSERVACIÓ DE KIVEXA



### Conservació del medicament

No conservar a temperatura superior a 30°.

No utilitzar el medicament després de la data de caducitat que aparegui a la caixa.

### Advertències

Mantingui els medicaments fora de l'abast dels nens.

Aquest medicament només es pot aconseguir a través del Servei de farmàcia de l'Hospital.

Retorni la medicació sobrant a la farmàcia de l'hospital.

Dipositi les restes del medicament o d'embalatge al punt SIGRE de la farmàcia més propera.

## IMPORTANT

PRENDRE TOTES LES DOSIS DEL MEDICAMENT PER TAL D'ASSEGURAR-SE L'ÈXIT DEL TRACTAMENT. Pot ajudar-se d'alarmes (per exemple, alarma del telèfon mòbil) o recordatoris per tal de no oblidar cap presa.

### Dades de la Farmàcia:

Nom de la farmàcia:

Horari:

Telèfon:

Email: