

Trizivir®

1. Nom comercial i principi actiu

Trizivir® (Abacavir/Lamivudina/Zidovudina)

2. Què es TRIZIVIR?

Trizivir® és una combinació de tres fàrmacs antivirals abacavir, lamivudina i zidovudina, 300mg, 150mg i 300mg indicats pel tractament de la infecció per VIH.



POSOLOGIA



Com s'ha de prendre TRIZIVIR

Trizivir® s'administra via oral. Cada comprimit conté 300 mg d'abacavir, 150 mg de lamivudina i 300 mg de zidovudina.

La dosi recomanada en adults és d'un comprimit, dos cops al dia. Prengui els comprimits sencers, sense partir ni mastegar, amb un got d'aigua. Pot prendre'ls amb o sense aliments.

Què fer si oblida una dosi?

Si oblida una dosi i es dona compte abans de que hagin passat menys de 6 hores, prengui la dosi el més aviat possible. Després continuï amb l'horari habitual. Si han transcorregut més de 6 hores, no prengui la dosi oblidada.

Esperi fins la següent presa a l'horari habitual.

Mai prengui una dosi doble per compensar un oblit.

ADVERTENCIES I PRECAUCIONS



Precaucions (al·lèrgies, excipients DO, embaràs, lactància, vacunes en teràpia biològica, etc.).

Aquest medicament no redueix el risc de transmissió del VIH mitjançant contacte sexual o contaminació sanguínia. Es recomana utilitzar mètodes de barrera (preservatiu) i prendre mesures apropiades per evitar el contagi del VIH a altres persones.

Ha d'avisar al seu metge si està embarassada o creu que pot estar-ho, així com si quedés embarassada durant el tractament.

Avisi al seu metge si té algun fill a qui estigui donant el pit.

Interaccions

Certs medicaments poden interferir en l'efecte del medicament disminuint el seu efecte o incrementant la seva toxicitat per aquest motiu és molt important que el metge o el farmacèutic estigui al corrent del que està prenent. La seva medicació habitual i que el metge /farmacèutic li ha informat que pot continuar prenent durant el tractament amb Trizivir és:

NO PRENGUI CAP ALTRE MEDICAMENT, SUPLEMENT DIETÈTIC O PLANTA MEDICINAL SENSE CONSULTAR ABANS AMB EL SEU METGE O FARMACÈUTIC

POSSIBLES EFECTES ADVERSOS



Gastrointestinals: nàusees, vòmits o diarrea.

Generals: cansament, mal de cap, pèrdua de la gana, sensació de formigueig o debilitat a les extremitats.

En alguns malalts por aparèixer una reacció al·lèrgica que pot arribar a ser greu. Els símptomes més freqüents són: taques o vermellor a la pell i febre. També pot aparèixer sensació de cansament excessiu, dificultat per respirar, nàusees amb vòmits, diarrees o mal d'estómac. Si apareguessin aquests símptomes, comunicui-ho al seu metge immediatament.

Si el seu metge ha interromput el tractament per aparició d'aquesta reacció al·lèrgica, mai torni a prendre Trizivir® o qualsevol altre fàrmac que contengui abacavir (Ziagen®, Kivexa®).

Davant de qualsevol efecte advers greu i que no cedeixi amb les recomanacions generals, contactar amb el seu metge o amb el servei d'urgències

CONSERVACIÓ DE TRIZIVIR



Conservació del medicament

Trizivir® s'ha de conservar a temperatura ambient, en un lloc fresc i sec. Els comprimits s'han de guardar a l'envàs original, ben tancat.

Advertències

Mantingui els medicaments fora de l'abast dels nens.

Aquest medicament només es pot aconseguir a través del Servei de farmàcia de l'Hospital.

Retorni la medicació sobrant a la farmàcia de l'hospital.

Dipositi les restes del medicament o d'embalatge al punt SIGRE de la farmàcia més propera.

IMPORTANT

PRENDRE TOTES LES DOSIS DEL MEDICAMENT PER TAL D'ASSEGURAR-SE L'ÈXIT DEL TRACTAMENT.

Pot ajudar-se d'alarmes (per exemple, alarma del telèfon mòbil) o recordatoris per tal de no oblidar cap presa.

Dades de la Farmàcia:

Nom de la farmàcia:

Horari:

Telèfon:

Email: