

Reyataz 150 mg

1. Nom comercial i principi actiu

REYATAZ® 150 mg (Atazanavir 150 mg)

2. Què és REYATAZ?

REYATAZ® conté 150 mg d'atazanavir en forma de càpsules és un medicament antiretroviral



POSOLOGIA



Com s'ha de prendre REYATAZ

Posologia: _____ càpsula cada ____ h (_ - _ - _)

Cal que prengui les càpsules senceres juntament amb Norvir® (Ritonavir) i AMB els aliments.

Què fer si oblida una dosi?

En el cas d'oblidar una dosi, prendre-la tan bon aviat com sigui possible, sempre que hagin passat menys de ____ hores i després pot continuar amb l'horari habitual.

No prengui MAI una dosi doble per compensar les dosis oblidades.

Si presenta vòmits i en el seu contingut observa els comprimits/càpsules senceres (habitualment < 2h post ingesta) torni a prendre el medicament. Si no és així, eviti repetir dosi i esperi a la següent presa.

ADVERTENCIES I PRECAUCIONS



Precaucions (al·lèrgies, excipients DO, embaràs, lactància, vacunes en teràpia biològica, etc.).

Embaràs: Reyataz® pot utilitzar-se durant l'embaràs però pot requerir modificacions de dosi per assegurar l'eficàcia i seguretat del medicament.

Si està embarassada o vol quedar-se embarassada, és important que ho comenti amb el seu metge.

Lactància: En general en mares infectades pel VIH, es recomana evitar donar el pit per minimitzar el risc de transmissió de la infecció al nadó.

No prengui aquest medicament si té al·lèrgia a algun dels seus components.

Reyataz® 150 mg càpsules conté com a excipient lactosa.

Interaccions

Certs medicaments poden interferir en l'efecte del medicament disminuint el seu efecte o incrementant la seva toxicitat per aquest motiu és molt important que el metge o el farmacèutic estigui al corrent del que està prenent. La seva medicació habitual i que el metge /farmacèutic li ha informat que pot continuar prenent durant el tractament amb REYATAZ® 150 mg és:

NO PRENGUI CAP ALTRE MEDICAMENT, SUPLEMENT DIETÈTIC O PLANTA MEDICINAL SENSE CONSULTAR ABANS AMB EL SEU METGE O FARMACÈUTIC

POSSIBLES EFECTES ADVERSOS



Molèsties gastrointestinals: diarrea, nàusees, dolor abdominal. En cas que presenti aquestes molèsties intenti menjar de forma fraccionada (5 preses) i fer una dieta lleugera (baix contingut gras) per facilitar la digestió. Al cap d'unes setmanes aquests símptomes solen millorar.

Reaccions d'al·lèrgia cutània. En cas que aparegui, consulti al seu metge perquè pugui valorar-ne la gravetat.

En alguns casos pot aparèixer coloració groguenca de la pell o del blanc dels ulls.

Davant de qualsevol efecte advers que no cedeixi amb les recomanacions generals, contacti amb el seu metge o amb el servei d'urgències.

CONSERVACIÓ DE REYATAZ



Conservació del medicament

No conservar a temperatura superior 25°.

No utilitzar el medicament després de la data de caducitat que aparegui a la caixa.

Advertències

Mantingui els medicaments fora de l'abast dels nens.

Aquest medicament només es pot aconseguir a través del Servei de farmàcia de l'Hospital.

Retorni la medicació sobrant a la farmàcia de l'hospital.

Dipositi les restes del medicament o d'embalatge al punt SIGRE de la farmàcia més propera.

IMPORTANT

PRENDRE TOTES LES DOSIS DEL MEDICAMENT PER TAL D'ASSEGURAR-SE L'ÈXIT DEL TRACTAMENT. Pot ajudar-se d'alarmes (per exemple, alarma del telèfon mòbil) o recordatoris per tal de no oblidar cap presa.

Dades de la Farmàcia:

Nom de la farmàcia:

Horari:

Telèfon:

Email:

Aquest tríptic No conté tota la informació d'aquest medicament i només pretén ser un resum per ajudar al pacient en el seu tractament.
Si té qualsevol dubte o necessita més informació contacti amb el seu metge o farmacèutic.

