

Videx® (didanosina)

1. Nom comercial i principi actiu

Videx® (didanosina)

2. Què esVIDEX?

Videx® conté didanosina en forma de comprimits recoberts i és un fàrmac antiviral



POSOLÓGIA

Com s'ha de prendre VIDEX

Videx® s'administra via oral. La dosi diària recomanada de Videx en adults depèn del pes del pacient:

- Pacients ≥ 60kg: 400mg al dia
- Pacients <60kg: 250mg al dia

La dosi diària per a nens dependrà de la seva superfície corporal i dels fàrmacs associats amb la didanosina.

La dosi es pot prendre un cop al dia o repartida en dos cops, però a cada presa haurà de prendre com a mínim dos comprimits. Segueixi les recomanacions del seu metge en quant a la dosi i freqüència d'administració.

Només els nens menors d'un any, rebran tota la dosi en un únic comprimit.

Aquest medicament es pren amb l'estomac buit, és a dir, 30 minuts abans o dues hores després de menjar. Els comprimits s'han de mastegar completament i empassar-los. Si ho prefereix, pot dissoldre els comprimits en mig got d'aigua o de suc de poma, agitar bé aquesta solució i prendre-la immediatament.

Què fer si oblida una dosi?

Si oblida una dosi i es dona compte quan està més pròxim de la següent presa, no cal que prengui la dosi oblidada.

Continuï amb el seu horari habitual. En cas contrari, prengui la dosi el més aviat possible. Mai dobli la dosi per compensar un oblit.

ADVERTENCIES I PRECAUCIONS

Precaucions (al·lèrgies, excipients DO, embaràs, lactància, vacunes en teràpia biològica, etc.).

Aquest medicament no redueix el risc de transmissió del VIH mitjançant contacte sexual o contaminació sanguínia.

Es recomana utilitzar mètodes de barrera (preservatiu) i prendre mesures apropiades per evitar el contagi del VIH a altres persones.

Ha d'avisar al seu metge si està embarassada o creu que pot estar-ho, així com si quedés embarassada durant el tractament.

Avisi al seu metge si té algun fill a qui estigui donant el pit.

Aquest medicament conté fenilalanina i sorbitol. Si vostè té intolerància al sorbitol ho ha de comunicar al seu metge per valorar l'ús del fàrmac. Tanmateix, pacients amb fenilcetonúria no haurien de rebre aquest medicament.

Interaccions

Certs medicaments poden interferir en l'efecte del medicament disminuint el seu efecte o incrementant la seva toxicitat per aquest motiu és molt important que el metge o el farmacèutic estigui al corrent del que està prenent. La seva medicació habitual i que el metge /farmacèutic li ha informat que pot continuar prenent durant el tractament amb Videx és:

NO PRENGUI CAP ALTRE MEDICAMENT, SUPLEMENT DIETÈTIC O PLANTA MEDICINAL SENSE CONSULTAR ABANS AMB EL SEU METGE O FARMACÈUTIC

Gastrointestinals: nàusees, vòmits o diarrea.

Altres: insensibilitat, dolor o formigueig a les mans i peus; febre, calfreds, mal de cap o cansament.

Davant de qualsevol efecte advers greu i que no cedeixi amb les recomanacions generals, contactar amb el seu metge o amb el servei d'urgències

CONSERVACIÓ DE VIDEX



Conservació del medicament

Videx® s'ha de conservar a temperatura ambient, en un lloc fresc i sec. Els comprimits s'han de guardar a l'envàs original, ben tancat.

Advertències

Mantingui els medicaments fora de l'abast dels nens.

Aquest medicament només es pot aconseguir a través del Servei de farmàcia de l'Hospital.

Retorni la medicació sobrant a la farmàcia de l'hospital.

Dipositi les restes del medicament o d'embalatge al punt SIGRE de la farmàcia més propera.

IMPORTANT

PRENDRE TOTES LES DOSIS DEL MEDICAMENT PER TAL D'ASSEGURAR-SE L'ÈXIT DEL TRACTAMENT.

Pot ajudar-se d'alarmes (per exemple, alarma del telèfon mòbil) o recordatoris per tal de no oblidar cap presa.

Dades de la Farmàcia:

Nom de la farmàcia:

Horari:

Telèfon:

Email: