

STRIBILD®

1. Nom comercial i principi actiu

STRIBILD® (elvitegravir/cobicistat/emtricitabina/tenofovir disproxil)
150/150/200/245 mg comprimits recoberts amb pel·lícula.

2. Què es STRIBILD®?

Stribild® està indicat pel tractament del VIH en pacients que no han rebut un tractament antirretroviral anterior o com a substitut del tractament en curs del VIH.



POSOLOGÍA



Com s'ha de prendre STRIBILD® (posologia i normes per a la correcta administració)

Posologia: 1 comprimit cada 24h

Els comprimits s'han de prendre sencers amb aliments.

Què fer si oblida una dosi o vomita:

En el cas d'oblidar una dosi, prendre-la tan aviat com sigui possible, sempre que hagin passat menys de 18 hores i després pot continuar amb l'horari habitual. Si han passat més de 18 hores, no prendre la dosi anterior i esperar a l'hora de la següent dosi.

No prengui MAI una dosi doble per compensar les dosis oblidades.

Si presenta vòmits en el termini d'una hora després de prendre el comprimit, torni a prendre el medicament. Si no és així, eviti repetir dosi i esperi a la següent presa.

ADVERTENCIES I PRECAUCIONS



Contraindicacions

Contraïndicat en pacients que han interromput el tractament amb tenofovir disoproxil fumarat per toxicitat renal.

Contraïndicat en persones menors de 18 anys.

Contraïndicat si està prenent:

- Alfuzosina
- Amiodarona, quinidina
- Carbamazepina, fenobarbital, fenitoína
- Rifampicina
- Dihidroergotamina, ergotamina, ergometrina
- Cisaprida
- Herba de San Juan
- Lovastatina, simvastatina
- Pimozida
- Sildenafil per la hipertensió pulmonar
- Midazolam administrat per via oral, triazolam

Precaucions (al·lèrgies, excipients DO, embaràs, lactància, vacunes en teràpia biològica, etc.).

L'ús d'Stribild® ha d'acompanyar-se de mètodes anticonceptius eficaços.

Lactància: NO utilitzar Stribild® durant la lactància.

NO es recomana donar el pit per risc de transmissió de la infecció al nadó.

Consulti amb el seu metge si està embarassada o té intenció de quedar-se embarassada.

NO prengui aquest medicament si té al·lèrgia a algun dels seus components.

Aquest medicament conté lactosa.

Interaccions

Certs medicaments poden interferir disminuint l'efecte o incrementant la toxicitat, per aquest motiu és molt important que el seu metge i farmacèutic estiguin al corrent de tot el que està prenent.

Stribild® no s'ha d'utilitzar concomitantment amb medicaments que continguin tenofovir disoproxil fumarat, lamivudina o adefovir dipivoxil utilitzats pel tractament de la infecció pel virus de la hepatitis B.

NO prendre Stribild® juntament amb altres fàrmacs antirretrovirals.

La seva medicació habitual i que el metge /farmacèutic l'ha informat que pot continuar prenent durant el tractament amb STRIBILD® és:

NO PRENGUI CAP ALTRE MEDICAMENT, SUPLEMENT DIETÈTIC O PLANTA MEDICINAL SENSE CONSULTAR ABANS AMB EL SEU METGE O FARMACÈUTIC

POSSIBLES EFECTES ADVERSOS



Les reaccions adverses més freqüents associades amb l'ús d'STRIBILD® són nàusees, vòmits, diarrea, debilitat, marejos i erupció.

Stribild® pot causar efectes adversos greus com acidosis làctica o trastorns del hepàtics. Si detecta algun dels següents efectes, comuniqui-ho al seu metge:

- Respiració ràpida i profunda
- Cansament
- Dolor estomacal, nàusees o vòmits
- Pell groguenca o icterícia (ulls groguencs)
- Orina de color fosc
- Femtes de color clar
- Inapetència per diversos dies o per un període perllongat
- Dolor abdominal

Aquest medicament també pot causar en menor freqüència:

- Trastorns renals
- Afeccions òssies
- Canvis en el greix corporal
- Síndrome inflamatori de reconstitució immunitària

CONSERVACIÓ DE STRIBILD



Conservació del medicament

Conservar el medicament en l'envàs original per protegir-lo de la humitat. Manténir l'envàs perfectament tancat.

Advertències

Mantingui els medicaments fora de l'abast dels nens.

Aquest medicament només es pot aconseguir a través del Servei de farmàcia de l'Hospital.

Retorni la medicació sobrant a la farmàcia de l'hospital.

IMPORTANT

PRENDRE TOTES LES DOSIS DEL MEDICAMENT PER TAL D'ASSEGURAR-SE L'ÈXIT DEL TRACTAMENT.

Pot ajudar-se d'alarmes (per exemple, alarma del telèfon mòbil) o recordatoris per tal de no oblidar cap presa.

Dades de la Farmàcia:

Nom de la farmàcia:

Horari:

Telèfon:

Email: