

Tivicay® (Dolutegravir)

1. Nom comercial i principi actiu

Videx® (didanosina)

2. Què es Tivicay?

Tivicay és un fàrmac antiretroviral utilitzat pel tractament de la infecció del VIH en combinació amb altres fàrmacs.



POSOLOGIA



Com s'ha de prendre TIVICAY® (posologia i normes per a la correcta administració)

Tivicay s'administra via oral. Cada comprimit de Tivicay conté 50 mg de dolutegravir.

La dosi diària recomanada és de 50 mg un cop al dia. Segueixi les indicacions del seu metge relacionades amb el seu tractament.

Pot prendre els comprimits amb o sense aliments, però ha d'empassar-los sencers, sense partir ni mastegar, preferiblement a la mateixa hora cada dia.

Què fer si oblida una dosi?

Si oblida una dosi, l'ha de prendre el més aviat possible i després continuar amb seu horari habitual. Si només li falten 4 hores o menys per prendre la següent dosi, no ha de prendre la dosi oblidada. Esperi fins la següent presa al seu horari habitual.

Mai prengui una dosi doble per compensar un oblit.

ADVERTENCIES I PRECAUCIONS



Precaucions (al·lèrgies, excipients DO, embaràs, lactància, vacunes en teràpia biològica, etc.).

Aquest medicament no redueix el risc de transmissió del VIH mitjançant contacte sexual o contaminació sanguínia.

Es recomana utilitzar mètodes de barrera (preservatiu) i prendre mesures apropiades per evitar el contagi del VIH a altres persones.

Ha d'avisar al seu metge si està embarassada o creu que pot estar-ho, així com si quedés embarassada durant el tractament. Avisi al seu metge si té algun fill a qui estigui donant el pit.

Interaccions

Certs medicaments poden interferir en l'efecte del medicament disminuint el seu efecte o incrementant la seva toxicitat per aquest motiu és molt important que el metge o el farmacèutic estigui al corrent del que està prenent.

- Suplements com ferro, calci: prendre'ls 2 hores abans o 6 hores després de Tivicay
- Antiàcids (hidròxid d'alumini o magnesi): prendre'ls 2 hores abans o 6 hores després de Tivicay
- Metformina: pot ser necessari reduir la dosi de metformina
- Antiepilèptics: evitar associació amb carbamazepina, fenitoïna, fenobarbital, oxcarbazepina
- Rifampicina: caldrà ajustar règim posològic de Tivicay
- No prengui productes d'herboristeria com Herba de Sant Joan (*Hypericum perforatum*)

La seva medicació habitual i que el metge / farmacèutic li ha informat que pot continuar prenent durant el tractament amb Tivicay és:

NO PRENGUI CAP ALTRE MEDICAMENT, SUPLEMENT DIETÈTIC O PLANTA MEDICINAL SENSE CONSULTAR ABANS AMB EL SEU METGE O FARMACÈUTIC

POSSIBLES EFECTES ADVERSOS



Gastrointestinals: nàusees, diarrees, vòmits, flatulència.

Neurològics: trastorns del son o insomni.

Dermatològics: picor o erupció cutània.

Altres: mareig, mal de cap, cansament.

Davant de qualsevol efecte advers greu i que no cedeixi amb les recomanacions generals, contactar amb el seu metge o amb el servei d'urgències

CONSERVACIÓ DE TIVICAY



Conservació del medicament

Tivicay® s'ha de conservar a temperatura ambient, en un lloc fresc i sec. Els comprimits s'han de guardar a l'envàs original, ben tancat.

Advertències

Mantingui els medicaments fora de l'abast dels nens.

Aquest medicament només es pot aconseguir a través del Servei de farmàcia de l'Hospital.

Retorni la medicació sobrant a la farmàcia de l'hospital.

Depositi les restes del medicament o d'embalatge al punt SIGRE de la farmàcia més propera.

IMPORTANT

PRENDRE TOTES LES DOSIS DEL MEDICAMENT PER TAL D'ASSEGURAR-SE L'ÈXIT DEL TRACTAMENT.

Pot ajudar-se d'alarmes (per exemple, alarma del telèfon mòbil) o recordatoris per tal de no oblidar cap presa.

Dades de la Farmàcia:

Nom de la farmàcia:

Horari:

Telèfon:

Email: