

ATRIPLA®

1. Nom comercial i principi actiu

ATRIPLA® (Efavirenz/emtricitabina/tenofovir) 600/200/245 mg comprimits recoberts amb pel·lícula.

2. Què és ATRIPLA?

Atripla® es un fàrmac antiretroviral que conté com a principi actiu efavirenz/emtricitabina/tenofovir 600/200/245 mg en forma de comprimits recoberts amb pel·lícula.



POSOLOGIA



Com s'ha de prendre ATRIPLA (posologia i normes per a la correcta administració)

Posologia: 1 comprimit cada 24h preferiblement abans d'anar a dormir.

És millor prendre els comprimits sense aliments (1 hora abans o 2 hores després de menjar) per millorar la tolerància, especialment al començament del tractament.

Què fer si oblida una dosi o vomita:

En el cas d'oblidar una dosi, prendre-la tan aviat com sigui possible, sempre que hagin passat menys de 12 hores i després pot continuar amb l'horari habitual.

No prengui MAI una dosi doble per compensar les dosis oblidades.

Si presenta vòmits i en el seu contingut observa els comprimits sencers (habitualment < 2h post ingesta) torni a prendre el medicament. Si no és així, eviti repetir dosi i esperi a la següent presa.

ADVERTENCIES I PRECAUCIONS

Precaucions (al·lèrgics, exipients DO, embaràs, lactància, neures, en teràpia biològica, etc.)

Embaràs:



Si està embarassada o vol quedar-se embarassada, és important que ho comenti amb el seu metge per poder prendre la combinació de fàrmacs més adequada.

Lactància:

NO es recomana donar el pit per risc de transmissió de la infecció al nadó.

No prengui aquest medicament si té al·lèrgia a algun dels seus components.

Aquest medicament conté 1 mmol (23,6 mg) de sodi per comprimit.

Interaccions

Certs medicaments poden interferir disminuint l'efecte o incrementant la toxicitat, per aquest motiu és molt important que el seu metge i farmacèutic estiguin al corrent de tot el que està prenent.

La seva medicació habitual i que el metge /farmacèutic l'ha informat que pot continuar prenent durant el tractament amb ATRIPLA® és:

NO PRENGUI CAP ALTRE MEDICAMENT, SUPLEMENT DIETÈTIC O PLANTA MEDICINAL SENSE CONSULTAR ABANS AMB EL SEU METGE O FARMACÈUTIC

POSSIBLES EFECTES ADVERSOS



Les reaccions adverses més freqüents associades amb l'ús d'ATRIPLA són marejos, somnolència, insomni, somnis anormals, alteracions de l'estat d'ànim, aquestes reaccions generalment milloren després de les primeres 2-4 setmanes.

Altres reaccions adverses freqüents són: mal de cap, diarrea, nàusees i erupcions a la pell.

Si presenta una erupció consulti el seu metge, generalment desapareixen sense canviar el tractament però pot haver-ne alguna de greu.

Davant de qualsevol efecte advers greu i que no cedeixi amb les recomanacions generals, contactar amb el seu metge o amb el servei d'urgències.



CONSERVACIÓ DE ARANESP

Conservació del medicament

No conservar a temperatura superior a 30°. Conservar a l'envàs original i protegit de la humitat.

No utilitzar el medicament després de la data de caducitat que aparegui a la caixa.

Advertències

Mantingui els medicaments fora de l'abast dels nens.

Aquest medicament només es pot aconseguir a través del Servei de farmàcia de l'Hospital.

Retorni la medicació sobrant a la farmàcia de l'hospital.

IMPORTANT

PRENDRE TOTES LES DOSIS DEL MEDICAMENT PER TAL D'ASSEGURAR-SE L'ÈXIT DEL TRACTAMENT. Pot ajudar-se d'alarmes (per exemple, alarma del telèfon mòbil) o recordatoris per tal de no oblidar cap presa.

Dades de la Farmàcia:

Nom de la farmàcia:

Horari:

Telèfon:

Email: