


## GENVOYA®

### 1. Nom comercial i principi actiu

GENVOYA® (elvitegravir/cobicistat/emtricitabina/tenofovir alafenamida) 150/150/200/10 mg comprimits recoberts amb pel·lícula.

### 2. Què es STRIBILD®?

Stribild® està indicat pel tractament del VIH en pacients que no han rebut un tractament antirretroviral anterior o com a substitut del tractament en curs del VIH.



## POSOLOGIA



Com s'ha de prendre GENVOYA® (posologia i normes per a la correcta administració)

Posologia: 1 comprimit cada 24h

Els comprimits s'han de prendre sencers (sense mastegar, triturar ni partir) amb aliments.

### Què fer si oblida una dosi o vomita:

En el cas d'oblidar una dosi, prendre-la tan aviat com sigui possible, sempre que hagin passat menys de 18 hores i després pot continuar amb l'horari habitual. Si han passat més de 18 hores, no prendre la dosi anterior i esperar a l'hora de la següent dosi.

No prengui MAI una dosi doble per compensar les dosis oblidades.

Si presenta vòmits en el termini d'una hora després de prendre el comprimit, torni a prendre el medicament. Si no és així, eviti repetir dosi i esperi a la següent presa.

## ADVERTENCIES I PRECAUCIONS



### Contraindicacions

No prengui Genvoya® si està prenent:

- Alfuzosina
- Amiodarona, quinidina
- Carbamazepina, fenobarbital, fenitoína
- Rifampicina
- Dihidroergotamina, ergotamina, ergometrina
- Cisaprida
- Herba de San Juan
- Lovastatina, simvastatina
- Pimozida
- Sildenafil per la hipertensió pulmonar
- Midazolam administrat per via oral, triazolam

### Precaucions (al·lèrgies, excipients DO, embaràs, lactància, vacunes en teràpia biològica, etc.).

L'ús de Genvoya® ha d'acompanyar-se de mètodes anticonceptius eficaços.

Lactància: NO doni el pit al seu fill durant el tractament amb Genvoya®. NO es recomana donar el pit per risc de transmissió de la infecció al nadó.

Consulti amb el seu metge si està embarassada o té intenció de quedar-se embarassada.

NO prengui aquest medicament si té al·lèrgia a algun dels seus components.

No administri aquest medicament a nens <12 anys o que pesin <35kg.

Aquest medicament conté lactosa.

#### Interaccions

Certs medicaments poden interferir disminuint l'efecte o incrementant la toxicitat, per aquest motiu és molt important que el seu metge i farmacèutic estiguin al corrent de tot el que està prenent.

Genvoya® no s'ha d'utilitzar concomitantment amb medicaments que continguin tenofovir, lamivudina o adefovir dipivoxil utilitzats pel tractament de la infecció pel virus de la hepatitis B.

NO prendre Genvoya® juntament amb altres fàrmacs antirretrovirals.

La seva medicació habitual i que el metge/farmacèutic l'ha informat que pot continuar prenent durant el tractament amb GENVOYA® és:

NO PRENGUI CAP ALTRE MEDICAMENT, SUPLEMENT DIETÈTIC O PLANTA MEDICINAL SENSE CONSULTAR ABANS AMB EL SEU METGE O FARMACÈUTIC

## POSSIBLES EFECTES ADVERSOS



Les reaccions adverses més freqüents associades a l'ús de GENVOYA® són

- Nàusees i vòmits
- Diarrea
- Fatiga i debilitat
- Mareig
- Erupció

Aquest medicament també pot causar en menor freqüència:

- Anèmia- Depressió
- Problemes digestius
- Inflor de cara, llavis, llengua o gola
- Prurit
- Problemes ossis

## CONSERVACIÓ DE STRIBILD



#### Conservació del medicament

Conservar el medicament en l'envàs original per protegir-lo de la humitat. Mantenir l'envàs perfectament tancat.

#### Advertències

Mantingui els medicaments fora de l'abast dels nens.

Aquest medicament només es pot aconseguir a través del Servei de farmàcia de l'Hospital.

Retorni la medicació sobrant a la farmàcia de l'hospital.

## IMPORTANT

PRENDRE TOTES LES DOSIS DEL MEDICAMENT PER TAL D'ASSEGURAR-SE L'ÈXIT DEL TRACTAMENT.

Pot ajudar-se d'alarmes (per exemple, alarma del telèfon mòbil) o recordatoris per tal de no oblidar cap presa.

### Dades de la Farmàcia:

Nom de la farmàcia:

Horari:

Telèfon:

Email: