

Emtricitabina tenofovir

1. Nom comercial i principi actiu

Emtricitabina tenofovir

2. Què es EMTRICITABINA TENOFOVIR?

Emtricitabina tenofovir conté 200mg d'emtricitabina i 245mg de tenofovir en forma de comprimits recoberts és una combinació de dos fàrmacs antivirals



POSOLOGIA



Com s'ha de prendre EMTRICITABINA TENOFOVIR

Emtricitabina tenofovir s'administra via oral. Cada comprimit conté 200 mg d'emtricitabina i 245 mg de tenofovir. La dosi recomanada és d'un comprimit diari amb aliments. Prengui el comprimit sencer amb un got d'aigua. Si té problemes per empassar-ho, el pot desfer en un got d'aigua, suc de taronja o de raïm i prendre'l immediatament, acompanyat d'aliment.

Què fer si oblida una dosi?

Si oblida una dosi i es dona compte abans de que hagin passat 12 hores, pot prendre la dosi tan aviat com sigui possible. Si han transcorregut més de 12 hores, no cal que prengui la dosi oblidada. Espera fins la següent presa a l'horari habitual.

No prengui mai una dosi doble per compensar un oblit.

ADVERTENCIES I PRECAUCIONS



Precaucions (al·lèrgies, excipients DO, embaràs, lactància, vacunes en teràpia biològica, etc.).

Aquest medicament no redueix el risc de transmissió del VIH mitjançant contacte sexual o contaminació sanguínia. Es recomana utilitzar mètodes de barrera (preservatiu).

Ha d'avisar al seu metge si està embarassada o creu que pot estar-ho, així com si quedés embarassada durant el tractament.

Avisi al seu metge si té algun fill a qui estigui donant el pit.

Si és intolerant a la galactosa, té insuficiència de Lapp lactasa o problemes d'absorció de glucosa o galactosa, contacti amb el seu metge. En aquests casos no hauria de prendre Truvada® perquè els comprimits contenen lactosa.

Interaccions

Certs medicaments poden interferir en l'efecte del medicament disminuint el seu efecte o incrementant la seva toxicitat per aquest motiu és molt important que el metge o el farmacèutic estigui al corrent del que està prenent. La seva medicació habitual i que el metge /farmacèutic li ha informat que pot continuar prenent durant el tractament amb Truvada és:

NO PRENGUI CAP ALTRE MEDICAMENT, SUPLEMENT DIETÈTIC O PLANTA MEDICINAL SENSE CONSULTAR ABANS AMB EL SEU METGE O FARMACÈUTIC

POSSIBLES EFECTES ADVERSOS



Gastrointestinals: nàusees, vòmits, diarrea o dolor abdominal.

Neurològics: mal de cap, malsons, insomni o marejos.

Dermatològics: picor, erupció cutània o hiperpigmentació.

Davant de qualsevol efecte advers greu i que no cedeixi amb les recomanacions generals, contactar amb el seu

metge o amb el servei d'urgències.

CONSERVACIÓ DE TRUVADA



Conservació del medicament

Truvada® s'ha de conservar a temperatura ambient, en un lloc fresc i sec. Els comprimits s'han de guardar a l'envàs original, ben tancat.

Advertències

Mantingui els medicaments fora de l'abast dels nens.

Aquest medicament només es pot aconseguir a través del Servei de farmàcia de l'Hospital.

Retorni la medicació sobrant a la farmàcia de l'hospital.

Dipositi les restes del medicament o d'embalatge al punt SIGRE de la farmàcia més propera.

IMPORTANT

PRENDRE TOTES LES DOSIS DEL MEDICAMENT PER TAL D'ASSEGURAR-SE L'ÈXIT DEL TRACTAMENT.

Pot ajudar-se d'alarmes (per exemple, alarma del telèfon mòbil) o recordatoris per tal de no oblidar cap presa.

Dades de la Farmàcia:

Nom de la farmàcia:

Horari:

Telèfon:

Email: