

Eviplera®

1. Nom comercial i principi actiu

EVIPLERA® (emtricitabina/rilpivirina/tenofovir) 200/25/245 mg comprimits recoberts amb pel·lícula.



POSOLÓGIA



Com s'ha de prendre EVIPLERA

Posologia: 1 comprimit cada 24h

Els comprimits s'han de prendre sencers amb aliments que continguin com a mínim unes 400 kcal.

Què fer si oblida una dosi?

En el cas d'oblidar una dosi, prendre-la tan aviat com sigui possible, sempre que hagin passat menys de 12 hores i després pot continuar amb l'horari habitual.

No prengui MAI una dosi doble per compensar les dosis oblidades.

Si presenta vòmits i en el seu contingut observa els comprimits sencers (habitualment < 2h post ingesta) torni a prendre el medicament. Si no és així, eviti repetir dosi i esperi a la següent presa.

ADVERTENCIES I PRECAUCIONS



Precaucions (al·lèrgies, excipients DO, embaràs, lactància, vacunes en teràpia biològica, etc.).

Embaràs: Si està embarassada o vol quedar-se embarassada, és important que ho comentis amb el seu metge per poder prendre la combinació de fàrmacs més adequada.

Lactància: NO es recomana donar el pit per risc de transmissió de la infecció al nadó.

No prengui aquest medicament si té al·lèrgia a algun dels seus components.

Aquest medicament conté lactosa.

Interaccions

Certs medicaments poden interferir disminuint l'efecte o incrementant la toxicitat, per aquest motiu és molt important que el seu metge i farmacèutic estiguin al corrent de tot el que està prenent.

EVIPLERA® necessita que hi hagi acidesa a l'estómac perquè s'absorbeixi bé, per tant, els protectors d'estómac i antiàcids poden disminuir la quantitat d'EVIPLERA que s'absorbeix:

- Els inhibidors de la bomba de protons (omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol) no es poden prendre.
- Si necessita un antagonista H2 (ranitidina, famotidina, cimetidina, nizatidina) l'ha de prendre 12 hores abans o 4 hores després de l'EVIPLERA.
- Si necessita un antiàcid (hidròxid d'alumini/magnesi o carbonat càlcic) l'ha de prendre 2 hores abans o 4 hores després de l'EVIPLERA.

La seva medicació habitual i que el metge /farmacèutic l'ha informat que pot continuar prenent durant el tractament amb EVIPLERA® és:

NO PRENGUI CAP ALTRE MEDICAMENT, SUPLEMENT DIETÈTIC O PLANTA MEDICINAL SENSE CONSULTAR ABANS AMB EL SEU METGE O FARMACÈUTIC

POSSIBLES EFECTES ADVERSOS



Les reaccions adverses més freqüents associades amb l'ús d'EVIPLERA® són diarrea, nàusees, marejos, mal de cap i erupcions a la pell.

Si presenta una erupció consulti el seu metge, generalment desapareixen sense canviar el tractament però pot haver-ne alguna de greu.

Davant de qualsevol efecte advers greu i que no cedeixi amb les recomanacions generals, contactar amb el seu metge o amb el servei d'urgències.

CONSERVACIÓ DE EVIPLERA



Conservació del medicament

No conservar a temperatura superior a 30°. Conservar a l'envàs original i protegit de la humitat.

No utilitzar el medicament després de la data de caducitat que aparegui a la caixa.

Advertències

Mantingui els medicaments fora de l'abast dels nens.

Aquest medicament només es pot aconseguir a través del Servei de farmàcia de l'Hospital.

Retorni la medicació sobrant a la farmàcia de l'hospital.

IMPORTANT

PRENDRE TOTES LES DOSIS DEL MEDICAMENT PER TAL D'ASSEGURAR-SE L'ÈXIT DEL TRACTAMENT. Pot ajudar-se d'alarmes (per exemple, alarma del telèfon mòbil) o recordatoris per tal de no oblidar cap presa.

Dades de la Farmàcia:

Nom de la farmàcia:

Horari:

Telèfon:

Email: