

Intelence®

1. Nom comercial i principi actiu

INTELENCE® (Etravirina) 200 mg comprimits



POSOLÒGIA



Com s'ha de prendre INTELENCE

Posologia: _____ comprimit cada ___ h

Prengui els comprimits amb aliments perquè s'absorbeixin bé.

Si no pot empassar els comprimits sencers els pot dissoldre en una mica d'aigua, remeni bé i begui-s'ho de seguida.

Afegeixi una mica més d'aigua i begui de nou el contingut per garantir que pren tota la dosi (no faci servir aigua calenta ni begudes gasoses).

En el cas d'oblidar una dosi, prendre-la tan aviat com sigui possible, sempre que hagin passat menys de 6 hores i després pot continuar amb l'horari habitual.

No prengui MAI una dosi doble per compensar les dosis oblidades.

Si presenta vòmits i en el seu contingut observa els comprimits sencers (habitualment < 2h post ingesta) torni a prendre el medicament. Si no és així, eviti repetir dosi i esperi a la següent presa.

ADVERTENCIES I PRECAUCIONS



Precaucions (al·lèrgies, excipients DO, embaràs, lactància, vacunes en teràpia biològica, etc.).

Embaràs: Si està embarassada o vol quedar-se embarassada, és important que ho comentis amb el seu metge per poder prendre la combinació de fàrmacs més adequada.

Lactància: NO es recomana donar el pit per risc de transmissió de la infecció al nadó.

No prengui aquest medicament si té al·lèrgia a algun dels seus components.

Interaccions

Certs medicaments poden interferir disminuint l'efecte o incrementant la toxicitat, per aquest motiu és molt important que el seu metge i farmacèutic estiguin al corrent de tot el que està prenent.

La seva medicació habitual i que el metge /farmacèutic l'ha informat que pot continuar prenent durant el tractament amb INTELENCE® és:

NO PRENGUI CAP ALTRE MEDICAMENT, SUPLEMENT DIETÈTIC O PLANTA MEDICINAL SENSE CONSULTAR ABANS AMB EL SEU METGE O FARMACÈUTIC

POSSIBLES EFECTES ADVERSOS

Les reaccions adverses més freqüents associades amb l'ús d'INTELENCE són mal de cap, diarrea, nàusees i erupcions a la pell.

Si presenta una erupció consulti el seu metge, generalment desapareixen sense canviar el tractament però pot haver-ne alguna de greu.

Davant de qualsevol efecte advers greu i que no cedeixi amb les recomanacions generals, contactar amb el seu metge o amb el servei d'urgències.

CONSERVACIÓ DE BARACLUDE



Conservació del medicament

No conservar a temperatura superior a 30°. Conservar a l'envàs original i protegit de la humitat. No utilitzar el medicament després de la data de caducitat que aparegui a la caixa.

Advertències

Mantingui els medicaments fora de l'abast dels nens.

Aquest medicament només es pot aconseguir a través del Servei de farmàcia de l'Hospital.

Retorni la medicació sobrant a la farmàcia de l'hospital.

IMPORTANT

PRENDRE TOTES LES DOSIS DEL MEDICAMENT PER TAL D'ASSEGURAR-SE L'ÈXIT DEL TRACTAMENT. Pot ajudar-se d'alarmes (per exemple, alarma del telèfon mòbil) o recordatoris per tal de no oblidar cap presa.

Dades de la Farmàcia:

Nom de la farmàcia:

Horari:

Telèfon:

Email:

Aquest tríptic No conté tota la informació d'aquest medicament i només pretén ser un resum per ajudar al pacient en el seu tractament. Si té qualsevol dubte o necessita més informació contacti amb el seu metge o farmacèutic.

