

Combivir® (Lamivudina/Zidovudina)

1. Nom comercial i principi actiu

Combivir® (Lamivudina/Zidovudina)

2. Què és Combivir?

Combivir® és una combinació de dos fàrmacs antiretrovirals (lamivudina i zidovudina)



POSOLOGIA



Com s'ha de prendre COMBIVIR?

Combivir® s'administra via oral. Cada comprimit conté 150 mg de lamivudina i 300 mg de zidovudina. La dosi recomanada per a adults i adolescents a partir de 30 kg de pes és d'un comprimit dos cops al dia. Prengui els comprimits sencers, sense partir ni mastegar, amb un got d'aigua. Pot prendre el medicament sense aliments o durant els àpats.

Si té problemes per empassar els comprimits, pot partir-los i afegir-los a una petita quantitat de menjar o líquid, i prendre'ls immediatament.

Què fer si oblida una dosi o vomita:

Si oblida una dosi i se n'adona abans de que hagin transcorregut menys de 6 hores, prengui la dosi i després continui amb l'horari habitual. Si han passat més de 6 hores, no cal que prengui la dosi oblidada. Esperï fins la següent presa a l'horari habitual.

No prengui una dosi doble per compensar una dosi oblidada.

ADVERTENCIES I PRECAUCIONS



Precaucions (al·lèrgies, excipients DO, embaràs, lactància, vacunes en teràpia biològica, etc.).

Aquest medicament no redueix el risc de transmissió del VIH mitjançant contacte sexual o contaminació sanguínia. Es recomana utilitzar mètodes de barrera (preservatiu) i prendre mesures apropiades per evitar el contagi del VIH a altres persones.

Ha d'avisar al seu metge si està embarassada o creu que pot estar-ho, així com si quedés embarassada durant el tractament. Avisi al seu metge si té algun fill a qui estigui donant el pit.

Interaccions

Certs medicaments poden interferir en l'efecte del medicament disminuint el seu efecte o incrementant la seva toxicitat per aquest motiu és molt important que el metge o el farmacèutic estigui al corrent del que està prenent. La seva medicació habitual i que el metge /farmacèutic li ha informat que pot continuar prenent durant el tractament amb Combivir és:

NO PRENGUI CAP ALTRE MEDICAMENT, SUPLEMENT DIETÈTIC O PLANTA MEDICINAL SENSE CONSULTAR ABANS AMB EL SEU METGE O FARMACÈUTIC

POSSIBLES EFECTES ADVERSOS



Gastrointestinals: nàusees, vòmits o diarrea.

Generals: cansament, dificultat per respirar, febre, calfreds o mal de cap.

Altres: sensació de formigueig, dolor o picor a les mans i als peus o dolor muscular.

Davant de qualsevol efecte advers greu i que no cedeixi amb les recomanacions generals, contactar amb el seu metge o amb el servei d'urgències.

CONSERVACIÓ DE CELSENTRI



Conservació del medicament

Combivir® s'ha de conservar a temperatura ambient, en un lloc fresc i sec. Els comprimits s'han de guardar a l'envàs original, ben tancat.

Advertències

Mantingui els medicaments fora de l'abast dels nens.

Aquest medicament només es pot aconseguir a través del Servei de farmàcia de l'Hospital.

Retorni la medicació sobrant a la farmàcia de l'hospital.

Dipositi les restes del medicament o d'embalatge al punt SIGRE de la farmàcia més propera.

IMPORTANT

PRENDRE TOTES LES DOSIS DEL MEDICAMENT PER TAL D'ASSEGURAR-SE L'ÈXIT DEL TRACTAMENT. Pot ajudar-se d'alarmes (per exemple, alarma del telèfon mòbil) o recordatoris per tal de no oblidar cap presa.

Dades de la Farmàcia:

Nom de la farmàcia:

Horari:

Telèfon:

Email: