

Kaletra® (Lopinavir/Ritonavir)

1. Nom comercial i principi actiu

Kaletra® (Lopinavir/Ritonavir)

2. Què és KALETRA?

Kaletra® conté lopinavir/ritonavir 200mg i 100mg en forma de comprimits recoberts és una combinació de dos fàrmacs antiretrovirals.



POSOLOGIA



Com s'ha de prendre KALETRA

Kaletra s'administra via oral. Cada comprimit conté 200 mg de lopinavir i 50 mg de ritonavir. La dosi habitual és de dos comprimits dos cops al dia. Pot prendre la medicació amb o sense aliments; si té molèsties d'estómac quan els pren, els pot empassar amb algun aliment. Ha de prendre els comprimits sencers, sense mastegar ni partir. En cas de que tingui dificultats per empassar-los, consulti amb el seu metge; aquest medicament està disponible en solució oral.

Què fer si oblida una dos?

Si oblida una dosi i es dona compte abans de que hagi transcorregut menys de 6 hores, ha de prendre la dosi el més aviat possible i després continuar amb el seu horari habitual. Si han passat més de 6 hores, no cal que prengui la dosi oblidada; continuï amb l'horari habitual d'administració.

Mai prengui mai una dosi doble per compensar oblits.

ADVERTENCIES I PRECAUCIONS



Precaucions (al·lèrgies, excipients DO, embaràs, lactància, vacunes en teràpia biològica, etc.).

Precaucions (al·lèrgies, excipients DO, embaràs, lactància, vacunes en teràpia biològica, etc.).

Aquest medicament no redueix el risc de transmissió del VIH o Hepatitis B mitjançant contacte sexual o contaminació sanguínia. Es recomana utilitzar mètodes de barrera (preservatiu) i prendre mesures apropiades per evitar el contagi del VIH a altres persones.

Ha d'avisar al seu metge si està embarassada o creu que pot estar-ho, així com si quedés embarassada durant el tractament. Avisi al seu metge si té algun fill a qui estigui donant el pit.

Interaccions

Certs medicaments poden interferir en l'efecte del medicament disminuint el seu efecte o incrementant la seva toxicitat per aquest motiu és molt important que el metge o el farmacèutic estigui al corrent del que està prenent. La seva medicació habitual i que el metge /farmacèutic li ha informat que pot continuar prenent durant el tractament amb Kaletra és:

NO PRENGUI CAP ALTRE MEDICAMENT, SUPLEMENT DIETÈTIC O PLANTA MEDICINAL SENSE CONSULTAR ABANS AMB EL SEU METGE O FARMACÈUTIC

POSSIBLES EFECTES ADVERSOS



Gastrointestinals: nàusees, vòmits, diarrea, dolor abdominal.

Metabòlics: augment del colesterol i/o glucosa en sang, redistribució del greix que pot aparèixer a la cara.

Neurològics: mareigs, vertigen, mal de cap, insomni, sensació de formigueig o adormiment de mans, peus o al

voltant del llavis.

Altres: picor, disminució o pèrdua de la gana,

Davant de qualsevol efecte advers greu i que no cedeixi amb les recomanacions generals, contactar amb el seu metge o amb el servei d'urgències.

CONSERVACIÓ DE ISENTRESS



Conservació del medicament

Kaletra® comprimits s'ha de conservar a temperatura ambient, en un lloc fresc i sec. Els comprimits s'han de guardar a l'envàs original, ben tancat.

Advertències

Mantingui els medicaments fora de l'abast dels nens.

Aquest medicament només es pot aconseguir a través del Servei de farmàcia de l'Hospital.

Retorni la medicació sobrant a la farmàcia de l'hospital.

Dipositi les restes del medicament o d'embalatge al punt SIGRE de la farmàcia més propera.

IMPORTANT

PRENDRE TOTES LES DOSIS DEL MEDICAMENT PER TAL D'ASSEGURAR-SE L'ÈXIT DEL TRACTAMENT. Pot ajudar-se d'alarmes (per exemple, alarma del telèfon mòbil) o recordatoris per tal de no oblidar cap presa.

Dades de la Farmàcia:

Nom de la farmàcia:

Horari:

Telèfon:

Email: