

Viramune® (Nevirapina)

1. Nom comercial i principi actiu

Viramune® (Nevirapina)

2. Què esVIRAMUNE?

Viramune® conté nevirapina 400mg en forma de comprimits d'alliberació perllongada i és un fàrmac antiviral



POSOLOGÍA



Com s'ha de prendre NEVIRAPINA

Nevirapina s'administra via oral. Cada comprimit conté 400 mg de nevirapina.

La dosi recomanada és d'un comprimit diari.

Prengui els comprimits sencers, sense partir ni mastegar, amb un got d'aigua. La presa pot ser amb o sense aliments.

Que fer si oblida una dosi?

Si oblida una dosi i s'adona quan han passat menys de 8 hores, prengui la dosi el més aviat possible. Si han transcorregut més de 8 hores, no prengui la dosi oblidada i prengui la següent dosi a l'hora habitual. Mai dobli la dosi per compensar obllits.

ADVERTENCIES I PRECAUCIONS



Precaucions (al·lèrgies, excipients DO, embaràs, lactància, vacunes en teràpia biològica, etc.).

Aquest medicament no redueix el risc de transmissió del VIH mitjançant contacte sexual. Es recomana utilitzar mètodes de barrera (preservatiu).

Ha d'avisar al seu metge si està embarassada o creu que pot estar-ho, així com si quedés embarassada durant el tractament. Avisi al seu metge si té algun fill a qui estigui donant el pit.

Si és intolerant a la galactosa, té insuficiència de Lapp lactasa o problemes d'absorció de glucosa o galactosa, contacti amb el seu metge. En aquests casos no hauria de prendre Viramune® perquè els comprimits contenen lactosa.

Interaccions

Certs medicaments poden interferir en l'efecte del medicament disminuint el seu efecte o incrementant la seva toxicitat per aquest motiu és molt important que el metge o el farmacèutic estigui al corrent del que està prenent. La seva medicació habitual i que el metge /farmacèutic li ha informat que pot continuar prenent durant el tractament amb Nevirapina és:

NO PRENGUI CAP ALTRE MEDICAMENT, SUPLEMENT DIETÈTIC O PLANTA MEDICINAL SENSE CONSULTAR ABANS AMB EL SEU METGE O FARMACÈUTIC

POSSIBLES EFECTES ADVERSOS



Dermatològiques: erupcions cutànies com inflamació o envermelliment de la pell que pot anar acompanyat de picor. Si qualsevol reacció d'aquestes va acompanyada de simptomatologia general (febre, butllofes, lesions a la boca, conjuntivitis, inflor, dolors musculars o a les articulacions o malestar general), haurà d'interrompre immediatament el tractament i comunicar-ho al seu metge.

Generals: fatiga, mal de cap, febre, nàusees i somnolència.

Davant de qualsevol efecte advers greu i que no cedeixi amb les recomanacions generals, contactar amb el seu metge o amb el servei d'urgències.

CONSERVACIÓ DE NEVIRAPINA



Conservació del medicament

Viramune® s'ha de conservar a temperatura ambient, en un lloc fresc i sec. Conserveu l'envàs original ben tancat per protegir-ho de la humitat.

Advertències

Mantingui els medicaments fora de l'abast dels nens.

Aquest medicament només es pot aconseguir a través del Servei de farmàcia de l'Hospital.

Retorni la medicació sobrant a la farmàcia de l'hospital.

Dipositi les restes del medicament o d'embalatge al punt SIGRE de la farmàcia més propera.

IMPORTANT

PRENDRE TOTES LES DOSIS DEL MEDICAMENT PER TAL D'ASSEGURAR-SE L'ÈXIT DEL TRACTAMENT.

Pot ajudar-se d'alarmes (per exemple, alarma del telèfon mòbil) o recordatoris per tal de no oblidar cap presa.

Dades de la Farmàcia:

Nom de la farmàcia:

Horari:

Telèfon:

Email: