Isentress®

1. Nom comercial i principi actiu

Isentress® (Raltegravir)

2. Què és ISENTRESS?

Isentress® conté 400mg de raltegravir en forma de comprimits i és un fàrmac antiretroviral

POSOLOGÍA

Com s'ha de prendre INSENTRESS

Isentress® s'administra via oral. Cada comprimit conté 400 mg de raltegravir.
La dosi recomanada és un comprimit dos cops al dia. Prengui el comprimit sencer, sense partir ni mastegar, empassant-los amb ajuda d'un got d'aigua. Pot prendre el medicament amb o sense aliments.

Què fer si oblida una dos?

Si oblida una dosi i s'adona abans de que hagin transcorregut menys de 6 hores, pot prendre la dosi el més aviat que sigui possible. Si han passat més de 6 hores i està més a prop de la següent dosi, no cal que prengui la dosi oblidada.
Esperi fins la següent presa a l'horari habitual.
No prengui mai una dosi doble per compensar un oblit.

ADVERTENCIES I PRECAUCIONS

Precaucions (al·lèrgies, excipients DO, embaràs, lactància, vacunes en teràpia biològica, etc.).

Aquest medicament no redueix el risc de transmissió del VIH mitjançant contacte sexual o contaminació sanguínia. Es recomana utilitzar mètodes de barrera (preservatiu) i prendre les mesures necessàries per evitar el contagi del VIH a altres persones.
Ha d'avisar al seu metge si està embarassada o creu que pot estar-ho, així com si quedés embarassada durant el tractament. Avisi al seu metge si té algun fill a qui estigui donant el pit.
Si és intolerant a la galactosa, té insuficiència de Lapp lactasa o problemes d'absorció de glucosa o galactosa, contacti amb el seu metge. En aquests casos no hauria de prendre Isentress® per què els comprimits contenen lactosa.

Interaccions

Certs medicaments poden interferir disminuint l'efecte o incrementant la toxicitat, per aquest motiu és molt important que el seu metge i farmacèutic estiguin al corrent de tot el que està prenent.
La seva medicació habitual i que el metge /farmacèutic l'ha informat que pot continuar prenent durant el tractament amb INTELENCE® és:

NO PRENGUI CAP ALTRE MEDICAMENT, SUPLEMENT DIETÈTIC O PLANTA MEDICINAL SENSE CONSULTAR ABANS AMB EL SEU METGE O FARMACÈUTIC

POSSIBLES EFECTES ADVERSOS

Gastrointestinals: restrenyiment, diarrea, nàusees o flatulències.
Neurològics: marejos, vertigen o mal de cap. Cal que extremi la precaució si ha de conduir o manegar maquinària perillosa.
Altres: encara que és poc freqüent, ha d'avisar al seu metge si presentés cap símptoma dels següents: dolor

muscular o a les articulacions, rampes, pèrdua de força o enfosquiment de l'orina.
Davant de qualsevol efecte advers greu i que no cedeixi amb les recomanacions generals, contactar amb el seu metge o amb el servei d'urgències.

CONSERVACIÓ DE ISENTRESS

Conservació del medicament

Isentress® s'ha de conservar a temperatura ambient, en un lloc fresc i sec. Els comprimits s'han de guardar a l'envàs original, ben tancat.

Advertències

Mantingui els medicaments fora de l'abast dels nens.
Aquest medicament només es pot aconseguir a través del Servei de farmàcia de l'Hospital.
Retorni la medicació sobrant a la farmàcia de l'hospital.
Dipositi les restes del medicament o d'embalatge al punt SIGRE de la farmàcia més propera.

IMPORTANT

PRENDRE TOTES LES DOSIS DEL MEDICAMENT PER TAL D'ASSEGURAR-SE L'ÈXIT DEL TRACTAMENT. Pot ajudar-se d'alarmes (per exemple, alarma del telèfon mòbil) o recordatoris per tal de no oblidar cap presa.

Dades de la Farmàcia:

Nom de la farmàcia:
Horari:
Telèfon:
Email:

Aquest tríptic No conté tota la informació d'aquest medicament i només pretén ser un resum per ajudar al pacient en el seu tractament.
Si té qualsevol dubte o necessita més informació contacti amb el seu metge o farmacèutic.