

Norvir®

1. Nom comercial i principi actiu

NORVIR® 100 mg (Ritonavir 100 mg)

2. Què és NORVIR?

NORVIR® conté 100 mg de ritonavir en forma de comprimits recoberts amb pel·lícula que s'utilitza sempre en combinació amb altres medicaments antirretrovirals.



POSOLÒGIA



Com s'ha de prendre NORVIR

Posologia: _____ càpsula cada ____ h (_ - _ - _)

Cal que prengui els comprimits sencers juntament amb _____® i AMB aliments.

Què fer si oblida una dosi o vomita:

En el cas d'oblidar una dosi, prendre-la tan bon aviat com sigui possible, sempre que hagin passat menys de ____ hores i després pot continuar amb l'horari habitual.

No prengui MAI una dosi doble per compensar les dosis oblidades.

Si presenta vòmits i en el seu contingut observa els comprimits sencers (habitualment < 2h post ingesta) torni a prendre el medicament. Si no és així, eviti repetir dosi i esperi a la següent presa.

ADVERTENCIES I PRECAUCIONS



Precaucions (al·lèrgies, excipients DO, embaràs, lactància, vacunes en teràpia biològica, etc.).

Embaràs: NORVIR® pot utilitzar-se durant l'embaràs però el seu metge és qui ha de valorar si és el més adequat en el seu cas. Si està embarassada o vol quedar-se embarassada, és important que ho comenti amb el seu metge.

Lactància: En general en mares infectades pel VIH, es recomana evitar donar el pit per minimitzar el risc de transmissió de la infecció al nadó.

No prengui aquest medicament si té al·lèrgia a algun dels seus components.

Interaccions

Certs medicaments poden interferir en l'efecte del medicament disminuint el seu efecte o incrementant la seva toxicitat per aquest motiu és molt important que el metge o el farmacèutic estigui al corrent del que està prenent. La seva medicació habitual i que el metge /farmacèutic li ha informat que pot continuar prenent durant el tractament amb NORVIR® 100 mg és:

NO PRENGUI CAP ALTRE MEDICAMENT, SUPLEMENT DIETÈTIC O PLANTA MEDICINAL SENSE CONSULTAR ABANS AMB EL SEU METGE O FARMACÈUTIC

POSSIBLES EFECTES ADVERSOS



Les reaccions adverses associades amb l'ús de ritonavir com a potenciador farmacocinètic depenen del medicament que s'administra juntament amb ell.

Davant de qualsevol efecte advers greu i que no cedeixi amb les recomanacions generals, contactar amb el seu metge o amb el servei d'urgències.



Conservació del medicament

No conservar a temperatura superior a 30°. Conservar a l'envàs original i protegit de la humitat.
No utilitzar el medicament després de la data de caducitat que aparegui a la caixa.humitat.

Advertències

Mantingui els medicaments fora de l'abast dels nens.

Aquest medicament només es pot aconseguir a través del Servei de farmàcia de l'Hospital.

Retorni la medicació sobrant a la farmàcia de l'hospital.

IMPORTANT

PRENDRE TOTES LES DOSIS DEL MEDICAMENT PER TAL D'ASSEGURAR-SE L'ÈXIT DEL TRACTAMENT. Pot ajudar-se d'alarmes (per exemple, alarma del telèfon mòbil) o recordatoris per tal de no oblidar cap presa.

Dades de la Farmàcia:

Nom de la farmàcia:

Horari:

Telèfon:

Email: