

Zidovudina EFG® (Zidovudina)

1. Nom comercial i principi actiu

Zidovudina EFG® (Zidovudina)

2. Què és ZIDOVUDINA?

Zidovudina és un fàrmac antiviral



POSOLÓGIA



Com s'ha de prendre ZIDOVUDINA

Zidovudina s'administra via oral. La dosi recomanada és de 500 mg o 600 mg diaris repartits en dos o tres preses. Els comprimits o càpsules las ha de prendre sense partir, mastegar ni obrir, amb un got d'aigua. Pot prendre-les amb o sense aliments, però si les pren amb un àpat, aquest no pot ser un aliment greixós.

Què fer si oblida una dosi?

Zidovudina s'administra via oral. La dosi recomanada és de 500 mg o 600 mg diaris repartits en dos o tres preses. Els comprimits o càpsules las ha de prendre sense partir, mastegar ni obrir, amb un got d'aigua. Pot prendre-les amb o sense aliments, però si les pren amb un àpat, aquest no pot ser un aliment greixós.

ADVERTENCIES I PRECAUCIONS



Precaucions (al·lèrgies, excipients DO, embaràs, lactància, vacunes en teràpia biològica, etc.).

Aquest medicament no redueix el risc de transmissió del VIH mitjançant contacte sexual o contaminació sanguínia.

Es recomana utilitzar mètodes de barrera (preservatiu) i prendre mesures apropiades per evitar el contagi del VIH a altres persones.

Ha d'avisar al seu metge si està embarassada o creu que pot estar-ho, així com si quedés embarassada durant el tractament. Avisi al seu metge si té algun fill a qui estigui donant el pit.

Interaccions

Certs medicaments poden interferir en l'efecte del medicament disminuint el seu efecte o incrementant la seva toxicitat per aquest motiu és molt important que el metge o el farmacèutic estigui al corrent del que està prenent. La seva medicació habitual i que el metge /farmacèutic li ha informat que pot continuar prenent durant el tractament amb Zidovudina és:

NO PRENGUI CAP ALTRE MEDICAMENT, SUPLEMENT DIETÈTIC O PLANTA MEDICINAL SENSE CONSULTAR ABANS AMB EL SEU METGE O FARMACÈUTIC

POSSIBLES EFECTES ADVERSOS



Gastrointestinals: nàusees, vòmits

Neurològics: mal de cap, mareigs, somnolència. Si el fàrmac li produeix certa somnolència ha d'anar amb compte si ha de conduir o manegar maquinària perillosa.

Altres: dolor muscular, cansament, febre, calfreds, augment de la freqüència urinària, alteració del gust.

Davant de qualsevol efecte advers greu i que no cedeixi amb les recomanacions generals, contactar amb el seu metge o amb el servei d'urgències



Conservació del medicament

Zidovudina EFG® s'ha de conservar a temperatura ambient, en un lloc fresc i sec. Els comprimits s'han de guardar a l'envàs original, ben tancat.

Advertències

Mantingui els medicaments fora de l'abast dels nens.

Aquest medicament només es pot aconseguir a través del Servei de farmàcia de l'Hospital.

Retorni la medicació sobrant a la farmàcia de l'hospital.

Dipositi les restes del medicament o d'embalatge al punt SIGRE de la farmàcia més propera.

IMPORTANT

PRENDRE TOTES LES DOSIS DEL MEDICAMENT PER TAL D'ASSEGURAR-SE L'ÈXIT DEL TRACTAMENT.

Pot ajudar-se d'alarmes (per exemple, alarma del telèfon mòbil) o recordatoris per tal de no oblidar cap presa.

Dades de la Farmàcia:

Nom de la farmàcia:

Horari:

Telèfon:

Email: